



## RESOLUCIÓN DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD DE LA PRODUCCIÓN AGRARIA

**Nombre comercial:** FLIPPER  
**Número de autorización:** ES-00249  
**Estado:** Vigente  
**Fecha de inscripción:** 20/09/2017  
**Fecha de Caducidad:** 31/08/2022

**Titular**

**Alpha BioPesticides Limited**  
St John's Innovation Centre  
CB4 0WS Cowley Road  
(Cambridge)  
REINO UNIDO

**Fabricante**

**Alpha BioPesticides Limited**  
St John's Innovation Centre  
CB4 0WS Cowley Road  
(Cambridge)  
REINO UNIDO

**Composición:** SALES POTÁSICAS DE ÁCIDOS GRASOS C14-C20 48% [EW] P/V

**Envases:**

<b>Presentación/Capacidad/Material</b>
--

Botellas de HDPE/EVOH, HDPE/PA, HPDE/PEHD y COEX de 1 L, 3 L, 5 L y 10 L.
---

**Usos y dosis autorizados:**



USO	AGENTE	Dosis I/HA	Nº Aplic.	Intervalos	Vol. Caldo	FORMA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN (Condic. Específico)
Ámbito de Aplicación: Agrario - Tipo de Usuario: Profesional - Sistema de Cultivo: Aire libre - Método de Aplicación: Pulverización normal con tractor						
Adormidera	PULGONES	1	1-5	7 días	300 - 1000 l/ha	Uso menor por jerarquía. Incluye Aphis gossypii, Myzus persicae, Aphis fabae, Macrosiphum euphorbiae, Macrosiphum sp. Máximo 10 l/ha. BBCH 10-89.
	MOSCA BLANCA					Uso menor por jerarquía. Incluye Bemisia tabaci y Trialeurodes vaporariorum. Máximo 10 l/ha. BBCH 10-89.
	ÁCAROS					Uso menor por jerarquía. Incluye Tetranychus urticae. Máximo 10 l/ha. BBCH 10-89.
	TRIPS					Uso menor por jerarquía. Incluye Frankliniella occidentalis. Máximo 10 l/ha. BBCH 10-89.
Aguacate	PULGONES	1	1-5	7 días	300 - 1000 l/ha	Uso menor por jerarquía. Incluye Aphis gossypii, Aphis fabae, Macrosiphum euphorbiae, Myzus persicae. Máximo 10 l/ha. BBCH 10-89.
	MOSCA BLANCA					Uso menor por jerarquía. Incluye Aleurothrix floccosus. Máximo 10 l/ha. BBCH 10-89.
	ÁCAROS					Uso menor por jerarquía. Incluye Tetranychus urticae, Oligonychus sp. Máximo 10 l/ha. BBCH 10-89.
	TRIPS					Uso menor por jerarquía. Incluye Thrips sp. Máximo 10 l/ha. BBCH 10-89.



USO	AGENTE	Dosis I/HA	Nº Aplic.	Intervalos	Vol. Caldo	FORMA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN (Condic. Específico)
	COCHINILLAS					Uso menor por jerarquía. Incluye Pseudococcus sp. Máximo 10 l/ha. BBCH 10-89.
Alfalfa	PULGONES	1	1-5	7 días	300 - 1000 l/ha	Incluye Aphis gossypii, Myzus persicae, Aphis fabae, Macrosiphum euphorbiae, Macrosiphum sp.. Máximo 10 l/ha. BBCH 10-89.
	MOSCA BLANCA					Incluye Bemisia tabaci y Trialeurodes vaporariorum. Máximo 10 l/ha. BBCH 10-89.
	ÁCAROS					Incluye Tetranychus urticae. Máximo 10 l/ha. BBCH 10-89.
	TRIPS					Incluye Frankliniella occidentalis. Máximo 10 l/ha. BBCH 10-89.
Algodonero	PULGONES	1	1-5	7 días	300 - 1000 l/ha	Uso menor por jerarquía. Incluye Aphis gossypii, Myzus persicae, Aphis fabae, Macrosiphum euphorbiae, Macrosiphum sp. Máximo 10 l/ha. BBCH 10-89.
	MOSCA BLANCA					Uso menor por jerarquía. Incluye Bemisia tabaci y Trialeurodes vaporariorum. Máximo 10 l/ha. BBCH 10-89.
	ÁCAROS					Uso menor por jerarquía. Incluye Tetranychus urticae. Máximo 10 l/ha. BBCH 10-89.
	TRIPS					Uso menor por jerarquía. Incluye Frankliniella occidentalis. Máximo 10 l/ha. BBCH 10-89.



USO	AGENTE	Dosis I/HA	Nº Aplic.	Intervalos	Vol. Caldo	FORMA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN (Condic. Específico)
Árboles y arbustos frutales	PULGONES	1	1-5	7 días	300 - 1000 l/ha	Exclusivamente para viveros. Incluye Aphis gossypii, Myzus persicae, Aphis fabae, Macrosiphum euphorbiae, Macrosiphum sp., Myzus ornatus, Macrosiphoniella sanborni. Máximo 10 l/ha. BBCH 10-49.
	MOSCA BLANCA					Exclusivamente para viveros. Incluye Bemisia tabaci, Trialeurodes vaporariorum. Máximo 10 l/ha. BBCH 10-49.
	ACAROS					Exclusivamente para viveros. Incluye Tetranychus urticae. Máximo 10 l/ha. BBCH 10-49.
	TRIPS					Exclusivamente para viveros. Incluye Frankliniella occidentalis, Thrips sp. Máximo 10 l/ha. BBCH 10-49.
Arroz	PULGONES	1	1-5	7 días	300 - 1000 l/ha	Se aplica en la fase seca del cultivo. Incluye Aphis gossypii, Myzus persicae, Aphis fabae, Macrosiphum euphorbiae, Macrosiphum sp., Rhopalosiphum padi, Sitobion avenae, Metopolophium dirhodum. Máximo 10 l/ha. BBCH 10-89.
	MOSCA BLANCA					Se aplica en la fase seca del cultivo. Incluye Bemisia tabaci y Trialeurodes vaporariorum. Máximo 10 l/ha. BBCH 10-89.
	ÁCAROS					Se aplica en la fase seca del cultivo. Incluye Tetranychus urticae. Máximo 10 l/ha. BBCH 10-89.



USO	AGENTE	Dosis l/ha	Nº Aplic.	Intervalos	Vol. Caldo	FORMA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN (Condic. Específico)
	TRIPS					Se aplica en la fase seca del cultivo. Incluye Frankliniella occidentalis. Máximo 10 l/ha. BBCH 10-89.
Batata, boniato	PULGONES	1	1-5	7 días	300 - 1000 l/ha	Uso menor por jerarquía. Incluye Aphis gossypii, Aphis fabae, Macrosiphum euphorbiae, Myzus persicae. Máximo 10 l/ha. BBCH 10-89.
	ÁCAROS					Uso menor por jerarquía. Incluye Tetranychus urticae. Máximo 10 l/ha. BBCH 10-89.
	TRIPS					Uso menor por jerarquía. Incluye Thrips sp. Máximo 10 l/ha. BBCH 10-89.
Berenjena	ACAROS	1 - 2	1	-	300-2000 l/ha	Uso menor conforme al artículo 51 del Reglamento (CE) 1107/2009. Ver condicionamiento general (*). Incluye Tetranychus urticae. BBCH 10-89.
	MOSCA BLANCA					Uso menor conforme al artículo 51 del Reglamento (CE) 1107/2009. Ver condicionamiento general (*). Incluye Bemisia tabaci y Trialeurodes vaporariorum. BBCH 10-89.
	FRANKLINIELLA OCCIDENTALIS	300-2000 l/ha			Uso menor conforme al artículo 51 del Reglamento (CE) 1107/2009. Ver condicionamiento general (*). BBCH 10-89.	
	TUTA ABSOLUTA					



USO	AGENTE	Dosis l/ha	Nº Aplic.	Intervalos	Vol. Caldo	FORMA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN (Condic. Específico)
Bulbos hortícolas	PULGONES	1	1-5	7 días	300 - 1000 l/ha	Incluye ajo, cebolla, chalote y cebolleta. Incluye Aphis gossypii, Aphis fabae, Macrosiphum euphorbiae, Myzus persicae, Macrosiphum sp., Aulacorthum solani, Uroleucon sonchi, Megoura viciae, Aphis craccivora, Acyrthosiphon pisum, Acyrthosiphon sp. Máximo 10 l/ha. BBCH 10-89.
	MOSCA BLANCA					Incluye ajo, cebolla, chalote y cebolleta. Incluye Bemisia tabaci y Trialeurodes vaporariorum. Máximo 10 l/ha. BBCH 10-89.
	ÁCAROS					Incluye ajo, cebolla, chalote y cebolleta. Incluye Tetranychus urticae, Aceria tulipae. Máximo 10 l/ha. BBCH 10-89.
	TRIPS					Incluye ajo, cebolla, chalote y cebolleta. Incluye Frankliniella occidentalis. Máximo 10 l/ha. BBCH 10-89.
Caqui	PULGONES	1	1-5	7 días	300 - 1000 l/ha	Uso menor por jerarquía. Incluye Aphis gossypii, Aphis fabae, Macrosiphum euphorbiae, Myzus persicae. Máximo 10 l/ha. BBCH 10-89.
	MOSCA BLANCA					Uso menor por jerarquía. Incluye Aleurothrix floccosus, Dialeurodes citri. Máximo 10 l/ha. BBCH 10-89.
	ÁCAROS					Uso menor por jerarquía. Incluye Tetranychus urticae. Máximo 10 l/ha. BBCH 10-89.



USO	AGENTE	Dosis l/ha	Nº Aplic.	Intervalos	Vol. Caldo	FORMA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN (Condic. Específico)
	TRIPS					Uso menor por jerarquía. Incluye Frankliniella occidentalis. Máximo 10 l/ha. BBCH 10-89.
	COCHINILLAS					Uso menor por jerarquía. Incluye Pseudococcus viburni, Parthenolecanium corni, Planococcus ficus, Planococcus citri, Parlatoria oleae. Máximo 10 l/ha. BBCH 10-89.
Cebolla	POLILLA	1	1-5	7 días	300 - 1000 l/ha	Exclusivamente contra Dyspella Ulula. Máximo 10 l/ha. BBCH 10-89.
Cebolleta	POLILLA	1	1-5	7 días	300 - 1000 l/ha	Exclusivamente contra Dyspella Ulula. Uso menor por jerarquía. Máximo 10 l/ha. BBCH 10-89.
Cereales de invierno / primavera	PULGONES	1	1-5	7 días	300 - 1000 l/ha	Incluye trigo, cebada, avena, centeno, triticale, tritordeum. Incluye Aphis gossypii, Myzus persicae, Aphis fabae, Macrosiphum euphorbiae, Macrosiphum sp., Rhopalosiphum padi, Sitobion avenae, Metopolophium dirhodum. Máximo 10 l/ha. BBCH 10-89.
	MOSCA BLANCA					Incluye trigo, cebada, avena, centeno, triticale, tritordeum. Incluye Bemisia tabaci y Trialeurodes vaporariorum. Máximo 10 l/ha. BBCH 10-89.
	ÁCAROS					Incluye trigo, cebada, avena, centeno, triticale, tritordeum. Incluye Tetranychus urticae. Máximo 10 l/ha. BBCH 10-89.



USO	AGENTE	Dosis I/HA	Nº Aplic.	Intervalos	Vol. Caldo	FORMA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN (Condic. Específico)
	TRIPS					Incluye trigo, cebada, avena, centeno, triticale, tritordeum. Incluye Frankliniella occidentalis. Máximo 10 l/ha. BBCH 10-89.
Cerezo	DROSOPHILA	1	1-5	7 días	500 - 2000 l/ha	Incluye guindo. Incluye Drosophila suzukii. Máximo 10 l/ha. BBCH 10-89.
	PIOJO DE SAN JOSE					Incluye guindo. Máximo 10 l/ha. BBCH 10-89.
Cítricos	PULGONES	1	1-5	7 días	500 - 2500 l/ha	Incluye naranjo, mandarina (incluido clementino e híbridos), toronja, pomelo, limonero y lima. Incluye Aphis gossypii, Myzus persicae, Toxoptera auranti, Toxoptera citrici-dus, Aphis spiraecola (=Aphis citricola), Aphis fabae, Macrosiphum euphorbiae. Máximo 10 l/ha. BBCH 10-89.
	ÁCAROS					Incluye naranjo, mandarina (incluido clementino e híbridos), toronja, pomelo, limonero y lima. Incluye Tetranychus urticae, Panonychus citri. Máximo 10 l/ha. BBCH 10-89.
	MOSCA BLANCA					Incluye naranjo, mandarina (incluido clementino e híbridos), toronja, pomelo, limonero y lima. Incluye Trialeurodes vaporariorum, Aleurothrixus floccosus, Dialeurodes citri, Alerocanthus spiniferus, Parabemisia myricae. Máximo 10 l/ha. BBCH 10-89.





USO	AGENTE	Dosis I/HA	Nº Aplic.	Intervalos	Vol. Caldo	FORMA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN (Condic. Específico)
	TRIPS					Incluye naranjo, mandarina (incluido clementino e híbridos), toronja, pomelo, limonero y lima. Incluye Thripidae, Frankliniella occidentalis, Selenothrips rubrocinctus, Heliothrips haemorrhoidalis, Pezothrips kellyanus. Máximo 10 l/ha. BBCH 10-89.
	COCHINILLAS					Incluye naranjo, mandarina (incluido clementino e híbridos), toronja, pomelo, limonero y lima. Incluye Aonidiella aurantii, Ceroplastes sinensis. Máximo 10 l/ha. BBCH 10-89.
Colza	PULGONES	1	1-5	7 días	300 - 1000 l/ha	Uso menor por jerarquía. Incluye Aphis gossypii, Myzus persicae, Aphis fabae, Macrosiphum euphorbiae, Macrosiphum sp. Máximo 10 l/ha. BBCH 10-89.
	MOSCA BLANCA					Uso menor por jerarquía. Incluye Bemisia tabaci y Trialeurodes vaporariorum. Máximo 10 l/ha. BBCH 10-89.
	ÁCAROS					Uso menor por jerarquía. Incluye Tetranychus urticae. Máximo 10 l/ha. BBCH 10-89.
	TRIPS					Uso menor por jerarquía. Incluye Frankliniella occidentalis. Máximo 10 l/ha. BBCH 10-89.



USO	AGENTE	Dosis l/ha	Nº Aplic.	Intervalos	Vol. Caldo	FORMA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN (Condic. Específico)
Cucurbitáceas de piel no comestible	PULGONES	1	1-5	7 días	300 - 1000 l/ha	Incluye melón, calabaza y sandía. Incluye Aphis gossypii, Aphis fabae, Macrosiphum euphorbiae, Myzus persicae, Macrosiphum sp. Máximo 10 l/ha. BBCH 10-89.
	MOSCA BLANCA					Incluye melón, calabaza y sandía. Incluye Bemisia tabaci y Trialeurodes vaporariorum. Máximo 10 l/ha. BBCH 10-89.
	ÁCAROS					Incluye melón, calabaza y sandía. Incluye Tetranychus urticae. Máximo 10 l/ha. BBCH 10-89.
	TRIPS					Incluye melón, calabaza y sandía. Incluye Frankliniella occidentalis. Máximo 10 l/ha. BBCH 10-89.
Espárrago	ÁFIDOS	1	1-5	7 días	300 - 1000 l/ha	Uso menor por jerarquía. Incluye Brachycorynella asparagi. Máximo 10 l/ha. BBCH 10-89.



USO	AGENTE	Dosis I/HA	Nº Aplic.	Intervalos	Vol. Caldo	FORMA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN (Condic. Específico)
Especias e infusiones	PULGONES	1	1-5	7 días	300 - 1000 l/ha	Incluye anís, matalauva, comino, alcaravea, regaliz, azafrán, manzanillas, alhova, fonogreco, hierbaluisa, valeriana, ginseng, pimentero, cardamomo, enebro, vanilla, tamarindo, canelero, agarradera, jengibre y nuez moscada. Incluye Aphis gossypii, Aphis fabae, Macrosiphum euphorbiae, Myzus persicae, Macrosiphum sp., Aulacorthum solani, Uroleucon sonchi, Megoura viciae, Aphis craccivora, Acyrthosiphon pisum, Acyrthosiphon sp. Máximo 10 l/ha. BBCH 10-89.
	MOSCA BLANCA					Incluye anís, matalauva, comino, alcaravea, regaliz, azafrán, manzanillas, alhova, fonogreco, hierbaluisa, valeriana, ginseng, pimentero, cardamomo, enebro, vanilla, tamarindo, canelero, agarradera, jengibre y nuez moscada. Incluye Bemisia tabaci y Trialeurodes vaporariorum. Máximo 10 l/ha. BBCH 10-89.
	ÁCAROS					Incluye anís, matalauva, comino, alcaravea, regaliz, azafrán, manzanillas, alhova, fonogreco, hierbaluisa, valeriana, ginseng, pimentero, cardamomo, enebro, vanilla, tamarindo, canelero, agarradera, jengibre y nuez moscada. Incluye Tetranychus urticae. Máximo 10 l/ha. BBCH 10-89.



USO	AGENTE	Dosis l/ha	Nº Aplic.	Intervalos	Vol. Caldo	FORMA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN (Condic. Específico)
	TRIPS					Incluye anís, matalauva, comino, alcaravea, regaliz, azafrán, manzanillas, alhova, fonogreco, hierbaluisa, valeriana, ginseng, pimentero, cardamomo, enebro, vainilla, tamarindo, canelero, agarradera, jengibre y nuez moscada. Incluye Frankliniella occidentalis. Máximo 10 l/ha. BBCH 10-89.
Espinacas y similares	PULGONES	1	1-5	7 días	300 - 1000 l/ha	Incluye acelga, espinaca y verdolaga. Incluye Aphis gossypii, Aphis fabae, Macrosiphum euphorbiae, Myzus persicae, Macrosiphum sp., Nasonovia ribis-nigri, Acyrthosiphon sp., Aulacorthum sp., Uroleucon sonchi, Aphis sp. Máximo 10 l/ha. BBCH 10-17.
	MOSCA BLANCA					Incluye acelga, espinaca y verdolaga. Incluye Bemisia tabaci y Trialeurodes vaporariorum. Máximo 10 l/ha. BBCH 10-17.
	ÁCAROS					Incluye acelga, espinaca y verdolaga. Incluye Tetranychus urticae. Máximo 10 l/ha. BBCH 10-17.
	TRIPS					Incluye acelga, espinaca y verdolaga. Incluye Frankliniella occidentalis, Thrips tabaci, Thrips sp. Máximo 10 l/ha. BBCH 10-17.
	PSILA					Incluye acelga, espinaca y verdolaga. Incluye Psylla alni. Máximo 10 l/ha. BBCH 10-17.



USO	AGENTE	Dosis I/HA	Nº Aplic.	Intervalos	Vol. Caldo	FORMA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN (Condic. Específico)
Forestales y ornamentales leñosas	PULGONES	1	1-5	7 días	300 - 1000 l/ha	Incluye coníferas, frondosas, monocotiledóneas leñosas y arbustos y pequeños árboles ornamentales. Incluye también para uso en viveros. Incluye Aphis gossypii, Myzus persicae, Aphis fabae, Macrosiphum euphorbiae, Macrosiphum sp., Aulacorthum circumflexum, Myzus ornatus, Macrosiphoniella sanborni. Máximo 10 l/ha. BBCH 10-89 y BBCH 10-49 en viveros.
	MOSCA BLANCA					Incluye coníferas, frondosas, monocotiledóneas leñosas y arbustos y pequeños árboles ornamentales. Incluye también para uso en viveros. Incluye Bemisia tabaci y Trialeurodes vaporariorum. Máximo 10 l/ha. BBCH 10-89 y BBCH 10-49 en viveros.
	ÁCAROS					Incluye coníferas, frondosas, monocotiledóneas leñosas y arbustos y pequeños árboles ornamentales. Incluye también para uso en viveros. Incluye Tetranychus urticae. Máximo 10 l/ha. BBCH 10-89 y BBCH 10-49 en viveros.



USO	AGENTE	Dosis l/ha	Nº Aplic.	Intervalos	Vol. Caldo	FORMA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN (Condic. Específico)
	TRIPS					Incluye coníferas, frondosas, monocotiledóneas leñosas y arbustos y pequeños árboles ornamentales. Incluye también para uso en viveros. Incluye Frankliniella occidentalis. Máximo 10 l/ha. BBCH 10-89 y BBCH 10-49 en viveros.
Frutales de cáscara	PULGONES	1	1-5	7 días	500 - 2000 l/ha	Incluye almendro, avellano, nogal, pistachero, castaño, pacano y nuez de pecán. Incluye Aphis pomi, Myzus persicae, Hyalopterus pruni, Brachycaudus helichrysi, Brachycaudus schwartzi, Myzus varians, Aphis gossypii, Myzus cerasi, Pterochloroides persicae, Hyalopterus amygdali, Aphis fabae, Sitobion fragariae, Aphis idaei, Aphis ruborum, Amphorophora rubi, Rhopalosiphoninus ribesi-nus, Appelia prunicola (=Brachycaudus prunicola). Máximo 10 l/ha. BBCH 10-89.
	MOSCA BLANCA					Incluye almendro, avellano, nogal, pistachero, castaño, pacano y nuez de pecán. Incluye Bemisia tabaci y Trialeurodes vaporariorum. Máximo 10 l/ha. BBCH 10-89.
	ÁCAROS					Incluye almendro, avellano, nogal, pistachero, castaño, pacano y nuez de pecán. Incluye Tetranychus urticae, Phytoptus avellanae. Máximo 10 l/ha. BBCH 10-89.



USO	AGENTE	Dosis l/ha	Nº Aplic.	Intervalos	Vol. Caldo	FORMA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN (Condic. Específico)
	TRIPS					Incluye almendro, avellano, nogal, pistachero, castaño, pacano y nuez de pecán. Incluye Frankliniella occidentalis. Máximo 10 l/ha. BBCH 10-89.
	COCHINILLAS					Incluye almendro, avellano, nogal, pistachero, castaño, pacano y nuez de pecán. Incluye Eulecanium tiliae, Parthenolecanium corni, Ceroplastes sinensis, Saissetia oleae, Coccus hesperidum, Melanaspis sp., Sphaerolecanium prunastri, Pseudaulacaspis pentagona, Lepidosaphes ulmi, Melanaspis inopinata, Aeonidiella aurantii, Quadraspidiotus perniciosus, Pseudococcus sp. Máximo 10 l/ha. BBCH 10-89.
Frutales de hueso	PULGONES	1	1-5	7 días	500 - 2000 l/ha	Incluye melocotonero, nectarino e híbridos, albaricoquero, cerezo y ciruelo. Incluye Aphis pomi, Myzus persicae, Hyalopterus pruni, Brachycaudus helichrysi, Brachycaudus schwartzi, Myzus varians, Aphis gossypii, Myzus cerasi, Pterochloroides persicae, Hyalopterus amygdali, Aphis fabae, Sitobion fragariae, Aphis idaei, Aphis ruborum, Amphorophora rubi, Rhopalosiphoninus ribesinus, Appelia prunicola (=Brachycaudus prunicola). Máximo 10 l/ha. BBCH 10-89.



USO	AGENTE	Dosis I/HA	Nº Aplic.	Intervalos	Vol. Caldo	FORMA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN (Condic. Específico)
	MOSCA BLANCA					Incluye melocotonero, nectarino e híbridos, albaricoquero, cerezo y ciruelo. Incluye Bemisia tabaci y Trialeurodes vaporariorum. Máximo 10 l/ha. BBCH 10-89.
	ÁCAROS					Incluye melocotonero, nectarino e híbridos, albaricoquero, cerezo y ciruelo. Incluye Tetranychus urticae y Panonychus ulmi. Máximo 10 l/ha. BBCH 10-89.
	TRIPS					Incluye melocotonero, nectarino e híbridos, albaricoquero, cerezo y ciruelo. Incluye Frankliniella occidentalis. Máximo 10 l/ha. BBCH 10-89.
Frutales de pepita	PSILA	1	1-5	7 días	500 - 2000 l/ha	Incluye manzano, peral, níspero, níspero de Japón y membrillero. Incluye Cacopsylla pyri, Cacopsylla mali, Cacopsylla picta, Cacopsylla melanoneura. Máximo 10 l/ha. BBCH 10-89.





USO	AGENTE	Dosis I/HA	Nº Aplic.	Intervalos	Vol. Caldo	FORMA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN (Condic. Específico)
	PULGONES					Incluye manzano, peral, níspero, níspero de Japón y membrillero. Incluye Aphis pomi, Myzus persicae, Dysaphis plantaginea, Dysaphis pyri, Eriosoma lanigerum, Hyalopterus pruni, Brachycaudus helichrysi, Brachycaudus schwartzi, Myzus varians, Aphis gossypii, Myzus cerasi, Pterochloroides persicae, Hyalopterus amygdali, Aphis fabae, Sitobion fragariae, Aphis idaei, Amphorophora rubi, Rhopalosiphoninus ribesinus, Appelia prunicola (=Brachycaudus Prunicola). Máximo 10 l/ha. BBCH 10-89.
	MOSCA BLANCA					Incluye manzano, peral, níspero, níspero de Japón y membrillero. Incluye Bemisia tabaci y Trialeurodes vaporariorum. Máximo 10 l/ha. BBCH 10-89.
	ÁCAROS					Incluye manzano, peral, níspero, níspero de Japón y membrillero. Incluye Tetranychus urticae y Panonychus ulmi. Máximo 10 l/ha. BBCH 10-89.
	TRIPS					Incluye manzano, peral, níspero, níspero de Japón y membrillero. Incluye Frankliniella occidentalis. Máximo 10 l/ha. BBCH 10-89.
Girasol	PULGONES	1	1-5	7 días	300 - 1000 l/ha	Incluye Aphis gossypii, Myzus persicae, Aphis fabae, Macrosiphum euphorbiae, Macrosiphum sp.. Máximo 10 l/ha. BBCH 10-89.



USO	AGENTE	Dosis l/ha	Nº Aplic.	Intervalos	Vol. Caldo	FORMA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN (Condic. Específico)
	MOSCA BLANCA					Incluye Bemisia tabaci y Trialeurodes vaporariorum. Máximo 10 l/ha. BBCH 10-89.
	ÁCAROS					Incluye Tetranychus urticae. Máximo 10 l/ha. BBCH 10-89.
	TRIPS					Incluye Frankliniella occidentalis. Máximo 10 l/ha. BBCH 10-89.
Granado	PULGONES	1	1-5	7 días	300 - 1000 l/ha	Uso menor por jerarquía. Incluye Aphis gossypii, Aphis fabae, Macrosiphum euphorbiae, Myzus persicae. Máximo 10 l/ha. BBCH 10-89.
	MOSCA BLANCA					Uso menor por jerarquía. Incluye Bemisia tabaci y Trialeurodes vaporariorum. Máximo 10 l/ha. BBCH 10-89.
	ÁCAROS					Uso menor por jerarquía. Incluye Tetranychus urticae. Máximo 10 l/ha. BBCH 10-89.
	TRIPS					Uso menor por jerarquía. Incluye Thrips sp. Máximo 10 l/ha. BBCH 10-89.
Guayabo	PULGONES	1	1-5	7 días	300 - 1000 l/ha	Uso menor por jerarquía. Incluye Aphis gossypii, Aphis fabae, Macrosiphum euphorbiae, Myzus persicae. Máximo 10 l/ha. BBCH 10-89.
	MOSCA BLANCA					Uso menor por jerarquía. Incluye Bemisia tabaci y Trialeurodes vaporariorum. Máximo 10 l/ha. BBCH 10-89.



USO	AGENTE	Dosis I/HA	Nº Aplic.	Intervalos	Vol. Caldo	FORMA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN (Condic. Específico)
	ÁCAROS					Uso menor por jerarquía. Incluye Tetranychus urticae. Máximo 10 l/ha. BBCH 10-89.
	TRIPS					Uso menor por jerarquía. Incluye Frankliniella occidentalis. Máximo 10 l/ha. BBCH 10-89.
	COCHINILLAS					Uso menor por jerarquía. Incluye Pseudococcus viburni, Parthenolecanium corni, Planococcus ficus, Planococcus citri, Parlatoria oleae. Máximo 10 l/ha. BBCH 10-89.
Herbáceas extensivas	PULGONES	1	1-5	7 días	300 - 1000 l/ha	Exclusivamente para producción de simiente para la siembra. Incluye Aphis gossypii, Myzus persicae, Aphis fabae, Macrosiphum euphorbiae, Macrosiphum sp., Myzus ornatus, Macrosiphoniella sanborni. Máximo 10 l/ha. BBCH 10-49.
	MOSCA BLANCA					Exclusivamente para producción de simiente para la siembra. Incluye Bemisia tabaci, Trialeurodes vaporariorum. Máximo 10 l/ha. BBCH 10-49.
	ACAROS					Exclusivamente para producción de simiente para la siembra. Incluye Tetranychus urticae. Máximo 10 l/ha. BBCH 10-49.
	TRIPS					Exclusivamente para producción de simiente para la siembra. Incluye Frankliniella occidentalis, Thrips sp. Máximo 10 l/ha. BBCH 10-49.



USO	AGENTE	Dosis I/HA	Nº Aplic.	Intervalos	Vol. Caldo	FORMA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN (Condic. Específico)
Hierbas aromáticas y flores comestibles	PULGONES	1	1-5	7 días	300 - 1000 l/ha	<p>Uso menor conforme al artículo 51 del Reglamento (CE) 1107/2009. Ver condicionamiento general (*).            Incluye perifollo, cebollino, perejil, mentas incluida hierbabuena, cilantro, salvia, romero, tomillo, estragón, acedera, ajedrea, angélica, eneldo, hisopo, mejorana, melisa, orégano, albahaca, ruda, levístico, hierba limón, curcuma longa, clavo de especia, alcaparro.            Incluye Aphis gossypii, Aphis fabae, Macrosiphum euphorbiae, Myzus persicae, Macrosporium sp., Aulacorthum solani, Uroleucon sonchi, Megoura viciae, Aphis Craccivora, Acyrthosiphon pisium, Acyrthosiphon sp.            BBCH 10-89.</p>
	MOSCA BLANCA					<p>Uso menor conforme al artículo 51 del Reglamento (CE) 1107/2009. Ver condicionamiento general (*).            Incluye perifollo, cebollino, perejil, mentas incluida hierbabuena, cilantro, salvia, romero, tomillo, estragón, acedera, ajedrea, angélica, eneldo, hisopo, mejorana, melisa, orégano, albahaca, ruda, levístico, hierba limón, curcuma longa, clavo de especia, alcaparro.            Incluye Trialeurodes vaporariorum, Bemisia tabaci.            BBCH 10-89.</p>



USO	AGENTE	Dosis I/HA	Nº Aplic.	Intervalos	Vol. Caldo	FORMA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN (Condic. Específico)
	ÁCAROS					<p>Uso menor conforme al artículo 51 del Reglamento (CE) 1107/2009. Ver condicionamiento general (*).            Incluye perifollo, cebollino, perejil, mentas incluida hierbabuena, cilantro, salvia, romero, tomillo, estragón, acedera, ajedrea, angélica, eneldo, hisopo, mejorana, melisa, orégano, albahaca, ruda, levístico, hierba limón, curcuma longa, clavo de especia, alcaparro.            Incluye Tetranychus urticae.            BBCH 10-89.</p>
	TRIPS					<p>Uso menor conforme al artículo 51 del Reglamento (CE) 1107/2009. Ver condicionamiento general (*).            Incluye perifollo, cebollino, perejil, mentas incluida hierbabuena, cilantro, salvia, romero, tomillo, estragón, acedera, ajedrea, angélica, eneldo, hisopo, mejorana, melisa, orégano, albahaca, ruda, levístico, hierba limón, curcuma longa, clavo de especia, alcaparro.            Incluye Frankliniella occidentalis.            BBCH 10-89.</p>
Higuera	ÁCAROS	1	1-5	7 días	300 - 1000 l/ha	<p>Uso menor por jerarquía.            Incluye Tetranychus urticae.            Máximo 10 l/ha.            BBCH 10-89.</p>
	TRIPS					<p>Uso menor por jerarquía.            Incluye Thrips sp.            Máximo 10 l/ha.            BBCH 10-89.</p>



USO	AGENTE	Dosis I/HA	Nº Aplic.	Intervalos	Vol. Caldo	FORMA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN (Condic. Específico)
	COCHINILLAS					Uso menor por jerarquía. Incluye Ceroplastes sp. Máximo 10 l/ha. BBCH 10-89.
	PSILA					Uso menor por jerarquía. Incluye Homotoma ficus. Máximo 10 l/ha. BBCH 10-89.
Hortalizas del género Brassica	PULGONES	1	1-5	7 días	300 - 1000 l/ha	Incluye inflorescencias, brécol, coliflor, cogollos, col de Bruselas, repollo (hojas), col de China, berza, col y colirrábano. Incluye Aphis gossypii, Aphis fabae, Macrosiphum euphorbiae, Myzus persicae, Macrosiphum sp., Brevicoryne brassicae, Lipaphis erysime. Máximo 10 l/ha. BBCH 10-49.
	MOSCA BLANCA					Incluye inflorescencias, brécol, coliflor, cogollos, col de Bruselas, repollo (hojas), col de China, berza, col y colirrábano. Incluye Bemisia tabaci y Trialeurodes vaporariorum. Máximo 10 l/ha. BBCH 10-49.
	ÁCAROS					Incluye inflorescencias, brécol, coliflor, cogollos, col de Bruselas, repollo (hojas), col de China, berza, col y colirrábano. Incluye Tetranychus urticae. Máximo 10 l/ha. BBCH 10-49.
	TRIPS					Incluye inflorescencias, brécol, coliflor, cogollos, col de Bruselas, repollo (hojas), col de China, berza, col y colirrábano. Incluye Frankliniella occidentalis. Máximo 10 l/ha. BBCH 10-49.



USO	AGENTE	Dosis I/HA	Nº Aplic.	Intervalos	Vol. Caldo	FORMA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN (Condic. Específico)
Hortícolas	PULGONES	1	1-5	7 días	300 - 1000 l/ha	Exclusivamente para semilleros de hortícolas. Incluye Aphis gossypii, Myzus persicae, Aphis fabae, Macrosiphum euphorbiae, Macrosiphum sp., Myzus ornatus, Macrosiphoniella sanborni. Máximo 10 l/ha. BBCH 10-49.
	ACAROS					Exclusivamente para semilleros de hortícolas. Incluye Tetranychus urticae. Máximo 10 l/ha. BBCH 10-49.
	TRIPS					Exclusivamente para semilleros de hortícolas. Incluye Frankliniella occidentalis, Thrips sp. Máximo 10 l/ha. BBCH 10-49.
	MOSCA BLANCA					Exclusivamente para semilleros de hortícolas. Incluye Bemisia tabaci, Trialeurodes vaporariorum. Máximo 10 l/ha. BBCH 10-49.
Kiwi	ÁCAROS	1	1-5	7 días	300 - 1000 l/ha	Uso menor por jerarquía. Incluye Tetranychus urticae. Máximo 10 l/ha. BBCH 10-89.
	COCHINILLAS					Uso menor por jerarquía. Incluye Pseudaulacaspis pentagona. Máximo 10 l/ha. BBCH 10-89.
	CICADELIDOS					Uso menor por jerarquía. Incluye Metcalfa sp. Máximo 10 l/ha. BBCH 10-89.
	ALGODÓN					Uso menor por jerarquía. Incluye Euphyllura sp. Máximo 10 l/ha. BBCH 10-89.



USO	AGENTE	Dosis I/HA	Nº Aplic.	Intervalos	Vol. Caldo	FORMA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN (Condic. Específico)
Kumquat	PULGONES	1	1-5	7 días	500 - 2500 l/ha	<p>Uso menor por jerarquía.            Incluye Aphis gossypii, Myzus persicae, Aphis citricidus, Toxoptera auranti, Toxoptera criticola, Aphis spiraeicola (=Aphis criticola), Aphis fabae, Macrosiphum euphorbiae.            Máximo 10 l/ha.            BBCH 10-89.</p>
	MOSCA BLANCA					<p>Uso menor por jerarquía.            Incluye Trialeurodes vaporariorum, Aleurothrixus floccosus, Dialeurodes citri, Alerocanthus spiniferus, Parabemisia myricae.            Máximo 10 l/ha.            BBCH 10-89.</p>
	ÁCAROS					<p>Uso menor por jerarquía.            Incluye Tetranychus urticae, Panonychus citri.            Máximo 10 l/ha.            BBCH 10-89.</p>
	TRIPS					<p>Uso menor por jerarquía.            Incluye Thripidae, Frankliniella occidentalis, Selenothrips rubrocinctus, Heliothrips haemorrhoidalis, Pezothrips kellyanus.            Máximo 10 l/ha.            BBCH 10-89.</p>
	COCHINILLAS					<p>Uso menor por jerarquía.            Incluye Aonidiella aurantii, Ceroplastes sinensis.            Máximo 10 l/ha.            BBCH 10-89.</p>





USO	AGENTE	Dosis l/ha	Nº Aplic.	Intervalos	Vol. Caldo	FORMA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN (Condic. Específico)
Lechuga y similares	PULGONES	1	1-5	7 días	300 - 1000 l/ha	Incluye berro, mastuerzo, canónigos, lechuga, escarola, achicoria (hojas), rúcula, mostaza china, diente de león, barbarea y brotes tiernos, incluidas las especies de Brassica. Incluye Aphis gossypii, Aphis fabae, Macrosiphum euphorbiae, Myzus persicae, Macrosiphum sp., Nasonovia ribis-nigri, Acyrthosiphon sp., Aulacorthum sp., Uroleucon sonchi, Aphis sp. Máximo 10 l/ha. BBCH 10-17.
	MOSCA BLANCA					Incluye berro, mastuerzo, canónigos, lechuga, escarola, achicoria (hojas), rúcula, mostaza china, diente de león, barbarea y brotes tiernos, incluidas las especies de Brassica. Incluye Bemisia tabaci y Trialeurodes vaporariorum. Máximo 10 l/ha. BBCH 10-17.
	ÁCAROS					Incluye berro, mastuerzo, canónigos, lechuga, escarola, achicoria (hojas), rúcula, mostaza china, diente de león, barbarea y brotes tiernos, incluidas las especies de Brassica. Incluye Tetranychus urticae. Máximo 10 l/ha. BBCH 10-17.
	TRIPS					Incluye berro, mastuerzo, canónigos, lechuga, escarola, achicoria (hojas), rúcula, mostaza china, diente de león, barbarea y brotes tiernos, incluidas las especies de Brassica. Incluye Frankliniella occidentalis. Máximo 10 l/ha. BBCH 10-17.



USO	AGENTE	Dosis l/ha	Nº Aplic.	Intervalos	Vol. Caldo	FORMA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN (Condic. Específico)
Leguminosas de grano	PULGONES	1	1-5	7 días	300 - 1000 l/ha	Incluye altramuz, garbanzo, habas para grano, judías para grano, lentejas, guisantes para grano y almorta. Incluye Aphis gossypii, Aphis fabae, Macrosiphum euphorbiae, Myzus persicae, Macrosiphum sp., Aulacorthum solani, Uroleucon sonchi, Megoura viciae, Aphis craccivora, Acyrtosiphon pisum, Acyrtosiphon sp. Máximo 10 l/ha. BBCH 10-89.
	MOSCA BLANCA					Incluye altramuz, garbanzo, habas para grano, judías para grano, lentejas, guisantes para grano y almorta. Incluye Bemisia tabaci y Trialeurodes vaporariorum. Máximo 10 l/ha. BBCH 10-89.
	ÁCAROS					Incluye altramuz, garbanzo, habas para grano, judías para grano, lentejas, guisantes para grano y almorta. Incluye Tetranychus urticae. Máximo 10 l/ha. BBCH 10-89.
	TRIPS					Incluye altramuz, garbanzo, habas para grano, judías para grano, lentejas, guisantes para grano y almorta. Incluye Frankliniella occidentalis. Máximo 10 l/ha. BBCH 10-89.



USO	AGENTE	Dosis I/HA	Nº Aplic.	Intervalos	Vol. Caldo	FORMA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN (Condic. Específico)
Leguminosas verdes (frescas)	PULGONES	1	1-5	7 días	300 - 1000 l/ha	Incluye judías verdes, guisantes verdes y habas verdes. Incluye Aphis gossypii, Aphis fabae, Macrosiphum euphorbiae, Myzus persicae, Macrosiphum sp, Aulacorthum solani, Uroleucon sonchi, Megoura viciae, Aphis craccivora, Acyrthosiphon pisum, Acyrthosiphon sp. Máximo 10 l/ha. BBCH 10-89.
	MOSCA BLANCA					Incluye judías verdes, guisantes verdes y habas verdes. Incluye Bemisia tabaci y Trialeurodes vaporariorum. Máximo 10 l/ha. BBCH 10-89.
	ÁCAROS					Incluye judías verdes, guisantes verdes y habas verdes. Incluye Tetranychus urticae. Máximo 10 l/ha. BBCH 10-89.
	TRIPS					Incluye judías verdes, guisantes verdes y habas verdes. Incluye Frankliniella occidentalis. Máximo 10 l/ha. BBCH 10-89.
Lúpulo	PULGONES	1	1-5	7 días	300 - 1000 l/ha	Uso menor por jerarquía. Incluye Aphis gossypii, Myzus persicae, Aphis fabae, Macrosiphum euphorbiae, Macrosiphum sp. Máximo 10 l/ha. BBCH 10-89.
	MOSCA BLANCA					Uso menor por jerarquía. Incluye Bemisia tabaci y Trialeurodes vaporariorum. Máximo 10 l/ha. BBCH 10-89.



USO	AGENTE	Dosis l/ha	Nº Aplic.	Intervalos	Vol. Caldo	FORMA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN (Condic. Específico)
	ÁCAROS					Uso menor por jerarquía. Incluye Tetranychus urticae. Máximo 10 l/ha. BBCH 10-89.
	TRIPS					Uso menor por jerarquía. Incluye Frankliniella occidentalis. Máximo 10 l/ha. BBCH 10-89.
Maíz	PULGONES	1	1-5	7 días	300 - 1000 l/ha	Incluye Aphis gossypii, Myzus persicae, Aphis fabae, Macrosiphum euphorbiae, Macrosiphum sp., Rhopalosiphum padi, Sitobion avenae, Metopolophium dirhodum. Máximo 10 l/ha. BBCH 10-89.
	MOSCA BLANCA					Incluye Bemisia tabaci y Trialeurodes vaporariorum. Máximo 10 l/ha. BBCH 10-89.
	ÁCAROS					Incluye Tetranychus urticae. Máximo 10 l/ha. BBCH 10-89.
	TRIPS					Incluye Frankliniella occidentalis. Máximo 10 l/ha. BBCH 10-89.
Maíz dulce	PULGONES	1	1-5	7 días	300 - 1000 l/ha	Incluye Aphis gossypii, Myzus persicae, Aphis fabae, Macrosiphum euphorbiae, Macrosiphum sp., Rhopalosiphum padi, Sitobion avenae, Metopolophium dirhodum. Máximo 10 l/ha. BBCH 10-89.
	MOSCA BLANCA					Incluye Bemisia tabaci y Trialeurodes vaporariorum. Máximo 10 l/ha. BBCH 10-89.
	ÁCAROS					Incluye Tetranychus urticae. Máximo 10 l/ha. BBCH 10-89.



USO	AGENTE	Dosis l/ha	Nº Aplic.	Intervalos	Vol. Caldo	FORMA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN (Condic. Específico)
	TRIPS					Incluye Frankliniella occidentalis. Máximo 10 l/ha. BBCH 10-89.
Mango	PULGONES	1	1-5	7 días	500 - 2500 l/ha	Uso menor por jerarquía. Incluye Aphis gossypii, Aphis fabae, Macrosiphum euphorbiae, Myzus persicae. Máximo 10 l/ha. BBCH 10-89.
	MOSCA BLANCA					Uso menor por jerarquía. Incluye Bemisia tabaci y Trialeurodes vaporariorum. Máximo 10 l/ha. BBCH 10-89.
	ÁCAROS					Uso menor por jerarquía. Incluye Tetranychus urticae. Máximo 10 l/ha. BBCH 10-89.
	TRIPS					Uso menor por jerarquía. Incluye Frankliniella occidentalis. Máximo 10 l/ha. BBCH 10-89.
	COCHINILLAS					Uso menor por jerarquía. Incluye Pseudococcus viburni, Parthenolecanium corni, Planococcus ficus, Planococcus citri, Parlatoria oleae. Máximo 10 l/ha. BBCH 10-89.
Okra, quimbombo	PULGONES	1	1-5	7 días	300 - 1000 l/ha	Uso menor por jerarquía. Incluye Aphis gossypii, Aphis fabae, Macrosiphum euphorbiae, Myzus persicae, Macrosiphum sp. Máximo 10 l/ha. BBCH 10-89.



USO	AGENTE	Dosis l/ha	Nº Aplic.	Intervalos	Vol. Caldo	FORMA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN (Condic. Específico)
	MOSCA BLANCA					<p>Uso menor por jerarquía.                      Incluye Bemisia tabaci y Trialeurodes vaporariorum.                      Máximo 10 l/ha.                      BBCH 10-89.</p>
	ÁCAROS					<p>Uso menor por jerarquía.                      Incluye Tetranychus urticae.                      Máximo 10 l/ha.                      BBCH 10-89.</p>
	TRIPS					<p>Uso menor por jerarquía.                      Incluye Thripidae, Frankliniella occidentalis, Thrips tabaci, Thrips sp.                      Máximo 10 l/ha.                      BBCH 10-89.</p>
Olivo	PULGONES	1	1-5	7 días	500 - 2500 l/ha	<p>Incluye Aphis sp.                      Máximo 10 l/ha.                      BBCH 10-89.</p>
	MOSCA BLANCA					<p>Incluye Trialeurodes vaporariorum.                      Máximo 10 l/ha.                      BBCH 10-89.</p>
	TRIPS					<p>Incluye Thripidae.                      Máximo 10 l/ha.                      BBCH 10-89.</p>
	COCHINILLAS					<p>Incluye Saissetia Oleae, Leucaspis riccae, Aspidiotus nerii, Lepidosaphes ulmi, Pollinia pollini.                      Máximo 10 l/ha.                      BBCH 10-89.</p>
	ALGODÓN					<p>Máximo 10 l/ha.                      Incluye Euphyllura olivina.                      BBCH 10-89.</p>



USO	AGENTE	Dosis l/ha	Nº Aplic.	Intervalos	Vol. Caldo	FORMA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN (Condic. Específico)
Ornamentales herbáceas	PULGONES	1	1-5	7 días	300 - 1000 l/ha	Incluye begonia, ciclamen, dalia, gladiolo, jacinto, ismene, tulipán, narciso, azucena, violeta, geranio, malva, gerbera, anturio, clavel, crisantemo, petunia, agerato, cineraria, impatiens, Kalanchoe, lirio de los valles y lobelia, tagetes, caléndulas, capuchina. Incluye Aphis gossypii, Aphis fabae, Macrosiphum euphorbiae, Myzus persicae, Macrosiphum sp., Aulacorthum circumflexum, Myzus ornatus, Macrosiphoniella sanborni. Máximo 10 l/ha. BBCH 10-89.
	MOSCA BLANCA					Incluye begonia, ciclamen, dalia, gladiolo, jacinto, ismene, tulipán, narciso, azucena, violeta, geranio, malva, gerbera, anturio, clavel, crisantemo, petunia, agerato, cineraria, impatiens, Kalanchoe, lirio de los valles y lobelia, tagetes, caléndulas, capuchina. Incluye Bemisia tabaci y Trialeurodes vaporariorum. Máximo 10 l/ha. BBCH 10-89.



USO	AGENTE	Dosis I/HA	Nº Aplic.	Intervalos	Vol. Caldo	FORMA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN (Condic. Específico)
	ÁCAROS					Incluye begoña, ciclament, dalia, gladiolo, jacinto, ismene, tulipán, narciso, azucena, violeta, geranio, malva, gerbera, anturio, clavel, crisantemo, petunia, agérato, cineraria, impatiens, Kalanchoe, lirio de los valles y lobelia, tagetes, caléndulas, capuchina. Incluye Tetranychus urticae. Máximo 10 l/ha. BBCH 10-89.
	TRIPS					Incluye begoña, ciclament, dalia, gladiolo, jacinto, ismene, tulipán, narciso, azucena, violeta, geranio, malva, gerbera, anturio, clavel, crisantemo, petunia, agérato, cineraria, impatiens, Kalanchoe, lirio de los valles y lobelia, tagetes, caléndulas, capuchina. Incluye Frankliniella occidentalis. Máximo 10 l/ha. BBCH 10-89.
Papaya	PULGONES	1	1-5	7 días	300 - 1000 l/ha	Uso menor por jerarquía. Incluye Aphis gossypii, Aphis fabae, Macrosiphum euphorbiae, Myzus persicae. Máximo 10 l/ha. BBCH 10-89.
	MOSCA BLANCA					Uso menor por jerarquía. Incluye Bemisia tabaci y Trialeurodes vaporariorum. Máximo 10 l/ha. BBCH 10-89.
	ÁCAROS					Uso menor por jerarquía. Incluye Tetranychus urticae. Máximo 10 l/ha. BBCH 10-89.





USO	AGENTE	Dosis I/HA	Nº Aplic.	Intervalos	Vol. Caldo	FORMA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN (Condic. Específico)
	TRIPS					Uso menor por jerarquía. Incluye Frankliniella occidentalis. Máximo 10 l/ha. BBCH 10-89.
	COCHINILLAS					Uso menor por jerarquía. Incluye Pseudococcus viburni, Parthenolecanium corni, Planococcus ficus, Planococcus citri, Parlatoria oleae. Máximo 10 l/ha. BBCH 10-89.
Pastos y praderas	PULGONES	1	1-5	7 días	300 - 1000 l/ha	Incluye praderas naturales, pastizales, praderas de siembra, gramíneas (prados de siembra) y polifitas (prados de siembra). Incluye Aphis gossypii, Myzus persicae, Aphis fabae, Macrosiphum euphorbiae, Macrosiphum sp.. Máximo 10 l/ha. BBCH 10-89.
	MOSCA BLANCA					Incluye praderas naturales, pastizales, praderas de siembra, gramíneas (prados de siembra) y polifitas (prados de siembra). Incluye Bemisia tabaci y Trialeurodes vaporariorum. Máximo 10 l/ha. BBCH 10-89.
	ÁCAROS					Incluye praderas naturales, pastizales, praderas de siembra, gramíneas (prados de siembra) y polifitas (prados de siembra). Incluye Tetranychus urticae. Máximo 10 l/ha. BBCH 10-89.



USO	AGENTE	Dosis I/HA	Nº Aplic.	Intervalos	Vol. Caldo	FORMA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN (Condic. Específico)
	TRIPS					Incluye praderas naturales, pastizales, praderas de siembra, gramíneas (prados de siembra) y polifitas (prados de siembra). Incluye Frankliniella occidentalis. Máximo 10 l/ha. BBCH 10-89.
Patata	PULGONES	1	1-5	7 días	300 - 1000 l/ha	Incluye Aphis gossypii, Aphis fabae, Macrosiphum euphorbiae, Myzus persicae, Macrosiphum sp. Máximo 10 l/ha. BBCH 10-89.
	MOSCA BLANCA					Incluye Bemisia tabaci y Trialeurodes vaporariorum. Máximo 10 l/ha. BBCH 10-89.
	ÁCAROS					Incluye Tetranychus urticae. Máximo 10 l/ha. BBCH 10-89.
	TRIPS					Incluye Frankliniella occidentalis. Máximo 10 l/ha. BBCH 10-89.
Pimiento	PULGONES	1	1-5	7 días	300 - 1000 l/ha	Incluye Aphis gossypii, Aphis fabae, Macrosiphum euphorbiae, Myzus persicae, Macrosiphum sp. Máximo 10 l/ha. BBCH 10-89.
	MOSCA BLANCA					Incluye Bemisia tabaci y Trialeurodes vaporariorum. Máximo 10 l/ha. BBCH 10-89.
	ÁCAROS					Incluye Tetranychus urticae. Máximo 10 l/ha. BBCH 10-89.
	TRIPS					Incluye Frankliniella occidentalis. Máximo 10 l/ha. BBCH 10-89.



USO	AGENTE	Dosis l/ha	Nº Aplic.	Intervalos	Vol. Caldo	FORMA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN (Condic. Específico)
Pinos	PULGONES	1	1-5	7 días	500 - 2000 l/ha	Incluye pino piñonero. Incluye Aphis pomi, Myzus persicae, Hyalopterus pruni, Brachycaudus helichrysi, Brachycaudus schwartzi, Myzus varians, Aphis gossypii, Myzus cerasi, Pterochloroides persicae, Hyalopterus amygdali, Aphis fabae, Sitobion fragariae, Aphis idaei, Aphis ruborum, Amphorophora rubi, Rhopalosiphoninus ribesinus, Appelia prunicola (=Brachycaudus prunicola). Máximo 10 l/ha. BBCH 10-89.
	MOSCA BLANCA					Incluye pino piñonero. Incluye Bemisia tabaci y Trialeurodes vaporariorum. Máximo 10 l/ha. BBCH 10-89.
	ÁCAROS					Incluye pino piñonero. Incluye Tetranychus urticae, Phytoptus avellanae. Máximo 10 l/ha. BBCH 10-89.
	TRIPS					Incluye pino piñonero. Incluye Frankliniella occidentalis. Máximo 10 l/ha. BBCH 10-89.
	COCHINILLAS					Incluye pino piñonero. Incluye Eulecanium tiliae, Parthenolecanium corni, Ceroplastes sinensis, Saissetia oleae, Coccus hesperidum, Melanaspis sp., Sphaerolecanium prunastri, Pseudaulacaspis pentagona, Lepidosaphes ulmi, Melanaspis inopinata, Aeonidiella aurantii, Quadraspidiotus perniciosus, Pseudococcus sp. Máximo 10 l/ha. BBCH 10-89.



USO	AGENTE	Dosis I/HA	Nº Aplic.	Intervalos	Vol. Caldo	FORMA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN (Condic. Específico)
Piña Tropical	PULGONES	1	1-5	7 días	300 - 1000 l/ha	Uso menor por jerarquía. Incluye Aphis gossypii, Aphis fabae, Macrosiphum euphorbiae, Myzus persicae. Máximo 10 l/ha. BBCH 10-89.
	MOSCA BLANCA					Uso menor por jerarquía. Incluye Bemisia tabaci y Trialeurodes vaporariorum. Máximo 10 l/ha. BBCH 10-89.
	ÁCAROS					Uso menor por jerarquía. Incluye Tetranychus urticae. Máximo 10 l/ha. BBCH 10-89.
	TRIPS					Uso menor por jerarquía. Incluye Frankliniella occidentalis. Máximo 10 l/ha. BBCH 10-89.
	COCHINILLAS					Uso menor por jerarquía. Incluye Pseudococcus viburni, Parthenolecanium corni, Planococcus ficus, Planococcus citri, Parlatoria oleae. Máximo 10 l/ha. BBCH 10-89.
Platanera	PULGONES	1	1-5	7 días	300 - 1000 l/ha	Uso menor por jerarquía. Incluye Aphis gossypii, Aphis fabae, Macrosiphum euphorbiae, Myzus persicae. Máximo 10 l/ha. BBCH 10-89.
	MOSCA BLANCA					Uso menor por jerarquía. Incluye Aleurothrixus sp. Máximo 10 l/ha. BBCH 10-89.



USO	AGENTE	Dosis I/HA	Nº Aplic.	Intervalos	Vol. Caldo	FORMA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN (Condic. Específico)
	ÁCAROS					Uso menor por jerarquía. Incluye Tetranychus urticae. Máximo 10 l/ha. BBCH 10-89.
	TRIPS					Uso menor por jerarquía. Incluye Thrips sp, Hercinothrips femoralis, Thrips florum. Máximo 10 l/ha. BBCH 10-89.
	COCHINILLAS					Uso menor por jerarquía. Incluye Planococcus citri, Dysmicoccus grasii. Máximo 10 l/ha. BBCH 10-89.
Puerro	PSILA	1	1-5	7 días	300 - 1000 l/ha	Uso menor por jerarquía. Incluye Psylla alni. Máximo 10 l/ha. BBCH 10-89.
Rábano	PSILA	1	1-5	7 días	300 - 1000 l/ha	Uso menor por jerarquía. Incluye rábano y rabanillo. Incluye Psylla sp. Máximo 10 l/ha. BBCH 10-89. BBCH 10-89.
Raíces de achicoria (industrial)	PULGONES	1	1-5	7 días	300 - 1000 l/ha	Uso menor por jerarquía. Incluye Aphis gossypii, Myzus persicae, Aphis fabae, Macrosiphum euphorbiae, Macrosiphum sp. Máximo 10 l/ha. BBCH 10-89.
	MOSCA BLANCA					Uso menor por jerarquía. Incluye Bemisia tabaci y Trialeurodes vaporariorum. Máximo 10 l/ha. BBCH 10-89.
	ÁCAROS					Uso menor por jerarquía. Incluye Tetranychus urticae. Máximo 10 l/ha. BBCH 10-89.



USO	AGENTE	Dosis I/HA	Nº Aplic.	Intervalos	Vol. Caldo	FORMA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN (Condic. Específico)
	TRIPS					Uso menor por jerarquía. Incluye Frankliniella occidentalis. Máximo 10 l/ha. BBCH 10-89.
Raíces y tubérculos (excepto remolacha azucarera y patata)	PULGONES	1	1-5	7 días	300 - 1000 l/ha	Excepto boniato. Incluye remolacha forrajera, remolacha de mesa, zanahoria, nabo, apionabo, rábano, rábano rusticano, chirivía, rabanillo, salsifí, colinabo, escorzonera, pataca, aguaturma, tupinambo, raíz de perejil, batata, ñame y chufa. Incluye Aphis gossypii, Aphis fabae, Macrosiphum euphorbiae, Myzus persicae, Macrosiphum sp., Aulacorthum solani, Uroleucon sonchi, Megoura viciae, Aphis craccivora, Acyrtosiphon pisum, Acyrtosiphon sp. Máximo 10 l/ha. BBCH 10-89.
	MOSCA BLANCA					Excepto boniato. Incluye remolacha forrajera, remolacha de mesa, zanahoria, nabo, apionabo, rábano, rábano rusticano, chirivía, rabanillo, salsifí, colinabo, escorzonera, pataca, aguaturma, tupinambo, raíz de perejil, batata, ñame y chufa. Incluye Bemisia tabaci y Trialeurodes vaporariorum. Máximo 10 l/ha. BBCH 10-89.



USO	AGENTE	Dosis I/HA	Nº Aplic.	Intervalos	Vol. Caldo	FORMA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN (Condic. Específico)
	ÁCAROS					<p>Excepto boniato. Incluye remolacha forrajera, remolacha de mesa, zanahoria, nabo, apionabo, rábano, rábano rusticano, chirivía, rabanillo, salsifí, colinabo, escorzonera, pataca, aguaturma, tupinambo, raíz de perejil, batata, ñame y chufa.</p> <p>Incluye Tetranychus urticae.</p> <p>Máximo 10 l/ha. BBCH 10-89.</p>
	TRIPS					<p>Excepto boniato. Incluye remolacha forrajera, remolacha de mesa, zanahoria, nabo, apionabo, rábano, rábano rusticano, chirivía, rabanillo, salsifí, colinabo, escorzonera, pataca, aguaturma, tupinambo, raíz de perejil, batata, ñame y chufa.</p> <p>Incluye Frankliniella occidentalis.</p> <p>Máximo 10 l/ha. BBCH 10-89.</p>
Remolacha azucarera	PULGONES	1	1-5	7 días	300 - 1000 l/ha	<p>Incluye Aphis gossypii, Myzus persicae, Aphis fabae, Macrosiphum euphorbiae, Macrosiphum sp.</p> <p>Máximo 10 l/ha. BBCH 10-89.</p>
	MOSCA BLANCA					<p>Incluye Bemisia tabaci y Trialeurodes vaporariorum.</p> <p>Máximo 10 l/ha. BBCH 10-89.</p>
	ÁCAROS					<p>Incluye Tetranychus urticae.</p> <p>Máximo 10 l/ha. BBCH 10-89.</p>
	TRIPS					<p>Incluye Frankliniella occidentalis, Thrips tabaci, Thrips sp.</p> <p>Máximo 10 l/ha. BBCH 10-89.</p>



USO	AGENTE	Dosis l/ha	Nº Aplic.	Intervalos	Vol. Caldo	FORMA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN (Condic. Específico)
Rosales	PULGONES	1	1-5	7 días	300 - 1000 l/ha	Incluye Aphis gossypii, Myzus persicae, Aphis fabae, Macrosiphum euphorbiae, Macrosiphum sp., Myzus ornatus, Macrosiphoniella sanborni. Máximo 10 l/ha. BBCH 10-89.
	MOSCA BLANCA					Incluye Bemisia tabaci, Trialeurodes vaporariorum y Aleurocanthus spiniferus. Máximo 10 l/ha. BBCH 10-89.
	ÁCAROS					Incluye Tetranychus urticae. Máximo 10 l/ha. BBCH 10-89.
	TRIPS					Incluye Frankliniella occidentalis. Máximo 10 l/ha. BBCH 10-89.
Rúcula	PSILA	1	1-5	7 días	300 - 1000 l/ha	Uso menor por jerarquía. Incluye Psylla alni. Máximo 10 l/ha. BBCH 10-17.
Soja	PULGONES	1	1-5	7 días	300 - 1000 l/ha	Uso menor por jerarquía. Incluye Aphis gossypii, Myzus persicae, Aphis fabae, Macrosiphum euphorbiae, Macrosiphum sp. Máximo 10 l/ha. BBCH 10-89.
	MOSCA BLANCA					Uso menor por jerarquía. Incluye Bemisia tabaci y Trialeurodes vaporarium. Máximo 10 l/ha. BBCH 10-89.
	ÁCAROS					Uso menor por jerarquía. Incluye Tetranychus urticae. Máximo 10 l/ha. BBCH 10-89.





USO	AGENTE	Dosis l/ha	Nº Aplic.	Intervalos	Vol. Caldo	FORMA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN (Condic. Específico)
	TRIPS					Uso menor por jerarquía. Incluye Frankliniella occidentalis. Máximo 10 l/ha. BBCH 10-89.
Sorgo	PULGONES	1	1-5	7 días	300 - 1000 l/ha	Uso menor por jerarquía. Incluye Aphis gossypii, Myzus persicae, Aphis fabae, Macrosiphum euphorbiae, Macrosiphum sp., Rhopalosiphum padi, Sitobion avenae, Metopolophium dirhodum. Máximo 10 l/ha. BBCH 10-89.
	MOSCA BLANCA					Uso menor por jerarquía. Incluye Bemisia tabaci y Trialeurodes vaporariorum. Máximo 10 l/ha. BBCH 10-89.
	ÁCAROS					Uso menor por jerarquía. Incluye Tetranychus urticae. Máximo 10 l/ha. BBCH 10-89.
	TRIPS					Uso menor por jerarquía. Incluye Frankliniella occidentalis. Máximo 10 l/ha. BBCH 10-89.
Tabaco	PULGONES	1	1-5	7 días	300 - 1000 l/ha	Uso menor por jerarquía. Incluye Aphis gossypii, Myzus persicae, Aphis fabae, Macrosiphum euphorbiae, Macrosiphum sp., Myzus nicotianae. Máximo 10 l/ha. BBCH 10-89.
	MOSCA BLANCA					Uso menor por jerarquía. Incluye Bemisia tabaci y Trialeurodes vaporariorum. Máximo 10 l/ha. BBCH 10-89.



USO	AGENTE	Dosis I/HA	Nº Aplic.	Intervalos	Vol. Caldo	FORMA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN (Condic. Específico)
	ÁCAROS					Uso menor por jerarquía. Incluye Tetranychus urticae. Máximo 10 l/ha. BBCH 10-89.
	TRIPS					Uso menor por jerarquía. Incluye Frankliniella occidentalis y Thrips tabaci. Máximo 10 l/ha. BBCH 10-89.
Tallos jóvenes	PULGONES	1	1-5	7 días	300 - 1000 l/ha	Incluye espárrago, cardo, hinojo, alcachofa, puerro, ajete, ajo tierno, ruibarbo y borraja. Incluye Aphis gossypii, Aphis fabae, Macrosiphum euphorbiae, Myzus persicae, Macrosiphum sp., Aulacorthum solani, Uroleucon sonchi, Megoura viciae, Aphis craccivora, Acyrtosiphon pisum, Acyrtosiphon sp. Máximo 10 l/ha. BBCH 10-89.
	MOSCA BLANCA					Incluye espárrago, cardo, hinojo, alcachofa, puerro, ajete, ajo tierno, ruibarbo y borraja. Incluye Bemisia tabaci y Trialeurodes vaporariorum. Máximo 10 l/ha. BBCH 10-89.
	ÁCAROS					Incluye espárrago, cardo, hinojo, alcachofa, puerro, ajete, ajo tierno, ruibarbo y borraja. Incluye Tetranychus urticae. Máximo 10 l/ha. BBCH 10-89.
	TRIPS					Incluye espárrago, cardo, hinojo, alcachofa, puerro, ajete, ajo tierno, ruibarbo y borraja. Incluye Frankliniella occidentalis. Máximo 10 l/ha. BBCH 10-89.



USO	AGENTE	Dosis I/HA	Nº Aplic.	Intervalos	Vol. Caldo	FORMA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN (Condic. Específico)
Tomate	TRIPS	1 - 2	1	-	400-1000 l/ha	Incluye Thripidae, Frankliniella occidentalis, Thrips tabaci, Thrips sp. BBCH 10-89.
	MOSCA BLANCA					Incluye Bemisia tabaci y Trialeurodes vaporariorum. BBCH 10-89.
	ACAROS					Incluye Aculops lycopersici y Tetranychus urticae. BBCH 10-89.
	PULGONES					Incluye Myzus persicae, Macrosiphum euphorbiae, Aphis fabae y Aphis gossypii. BBCH 10-89.
	TUTA ABSOLUTA				300-2000 l/ha	.
Vid	PULGONES	1	1-5	7 días	300 - 1000 l/ha	Incluye vid de mesa y para vinificación. Incluye Aphis sp., Viteus vitifoliae. Máximo 10 l/ha. BBCH 10-89.
	MOSCA BLANCA					Incluye vid de mesa y para vinificación. Incluye Aleurocanthus spiniferus. Máximo 10 l/ha. BBCH 10-89.
	ÁCAROS					Incluye vid de mesa y para vinificación. Incluye Tetranychus urticae, Panonychus ulmi. Máximo 10 l/ha. BBCH 10-89.
	TRIPS					Incluye vid de mesa y para vinificación. Incluye Frankliniella occidentalis. Máximo 10 l/ha. BBCH 10-89.
	DROSOPHILA					Incluye vid de mesa y para vinificación. Incluye Drosophila suzukii. Máximo 10 l/ha. BBCH 10-89.



USO	AGENTE	Dosis I/HA	Nº Aplic.	Intervalos	Vol. Caldo	FORMA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN (Condic. Específico)
	COCHINILLAS					Incluye vid de mesa y para vinificación. Incluye Planococcus ficus, Parthenolecanium corni, Pulvinaria vitis, Pseudococcus citri. Máximo 10 l/ha. BBCH 10-89.
	CICADELIDOS					Incluye vid de mesa y para vinificación. Incluye Empoasca vitis, Sca-phoideus titanus, Metcalfa pruinosa. Máximo 10 l/ha. BBCH 10-89.
<b>Ámbito de Aplicación: Agrario - Tipo de Usuario: Profesional - Sistema de Cultivo: Invernadero - Método de Aplicación: Manual con lanza o pistola</b>						
Apio	PULGONES	1 - 1,6	1	-	300 - 1600	Uso menor conforme al artículo 51 del Reglamento (CE) 1107/2009. Ver condicionamiento general (*). Incluye Aphis gossypii, Aphis fabae, Macrosiphum euphorbiae, Myzus persicae. BBCH 10-49.
	MOSCA BLANCA					Uso menor conforme al artículo 51 del Reglamento (CE) 1107/2009. Ver condicionamiento general (*). Incluye Trialeurodes vaporariorum, Bemisia tabaci. BBCH 10-49.
	ACAROS					Uso menor conforme al artículo 51 del Reglamento (CE) 1107/2009. Ver condicionamiento general (*). Incluye Tetranychus urticae. BBCH 10-49.
	TRIPS					Uso menor conforme al artículo 51 del Reglamento (CE) 1107/2009. Ver condicionamiento general (*). BBCH 10-49.



USO	AGENTE	Dosis l/ha	Nº Aplic.	Intervalos	Vol. Caldo	FORMA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN (Condic. Específico)
Árboles y arbustos frutales	PULGONES	1	1-5	7 días	300 - 1000 l/ha	Exclusivamente para viveros. Incluye Aphis gossypii, Myzus persicae, Aphis fabae, Macrosiphum euphorbiae, Macrosiphum sp., Myzus ornatus, Macrosiphoniella sanborni. Máximo 10 l/ha. BBCH 10-89.
	MOSCA BLANCA					Exclusivamente para viveros. Incluye Bemisia tabaci, Trialeurodes vaporariorum. Máximo 10 l/ha. BBCH 10-49.
	ACAROS					Exclusivamente para viveros. Incluye Tetranychus urticae. Máximo 10 l/ha. BBCH 10-49.
	TRIPS					Exclusivamente para viveros. Incluye Frankliniella occidentalis, Thrips sp. Máximo 10 l/ha. BBCH 10-49.
Arbustos frutales	PULGONES	1 - 1,6	1-5	7 días	300-1600 l/ha	Incluye frambuesa, zarzamora, arándano y otros frutos pequeños. Uso en invernadero y uso protegido. Incluye Aphis gossypii, Aphis fabae, Macrosiphum euphorbiae, Myzus persicae. BBCH 10-89.
	ACAROS					Incluye frambuesa, zarzamora, arándano y otros frutos pequeños. Uso en invernadero y uso protegido. Incluye Tetranychus urticae. BBCH 10-89.
	TRIPS					Incluye frambuesa, zarzamora, arándano y otros frutos pequeños. Uso en invernadero y uso protegido. BBCH 10-89.



USO	AGENTE	Dosis I/HA	Nº Aplic.	Intervalos	Vol. Caldo	FORMA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN (Condic. Específico)
	DROSOPHILA					Incluye frambuesa, zarzamora, arándano y otros frutos pequeños. Uso en invernadero y uso protegido. Para Drosophila suzukii. BBCH 10-89.
Berenjena	MOSCA BLANCA	1 - 1,6	1-5	7 días	300-1600 l/ha	Uso menor conforme al artículo 51 del Reglamento (CE) 1107/2009. Ver condicionamiento general (*). Incluye Bemisia tabaci y Trialeurodes vaporariorum. BBCH 10-89.
	FRANKLINIELLA OCCIDENTALIS					Uso menor conforme al artículo 51 del Reglamento (CE) 1107/2009. Ver condicionamiento general (*). BBCH 10-89.
	ACAROS				300-1600 l/ha	Uso menor conforme al artículo 51 del Reglamento (CE) 1107/2009. Ver condicionamiento general (*). Incluye Tetranychus urticae. BBCH 10-89.
	TUTA ABSOLUTA				300-1600 l/ha	Uso menor conforme al artículo 51 del Reglamento (CE) 1107/2009. Ver condicionamiento general (*). BBCH 10-89.
Brotes tiernos, incluidas las especies de Brassica	PULGONES	1 - 1,6	1-5	7 días	300-1600 l/ha	Exclusivamente para Espinaca, Lechuga, Brécol, Coliflor y Repollo. Incluye Aphis gossypii, Aphis fabae, Macrosiphum euphorbiae, Myzus persicae. BBCH 10-49.
	ACAROS					Exclusivamente para Espinaca, Lechuga, Brécol, Coliflor y Repollo. Incluye Tetranychus urticae. BBCH 10-49.



USO	AGENTE	Dosis I/HA	Nº Aplic.	Intervalos	Vol. Caldo	FORMA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN (Condic. Específico)
	TRIPS					Exclusivamente para Espinaca, Lechuga, Brécol, Coliflor y Repollo. Incluye Frankliniella occidentalis. BBCH 10-49.
	MOSCA BLANCA					Exclusivamente para Espinaca, Lechuga, Brécol, Coliflor y Repollo. Incluye Trialeurodes vaporariorum y Bemisia tabaci. BBCH 10-49.
Bulbos hortícolas	PULGONES	1	1-5	7 días	300 - 1000 l/ha	Incluye ajo, cebolla, chalote y cebolleta. Incluye Aphis gossypii, Aphis fabae, Macrosiphum euphorbiae, Myzus persicae, Macrosiphum sp., Aulacorthum solani, Uroleucon sonchi, Megoura viciae, Aphis craccivora, Acyrtosiphon pisum, Acyrtosiphon sp. Máximo 10 l/ha. BBCH 10-89.
	MOSCA BLANCA					Incluye ajo, cebolla, chalote y cebolleta. Incluye Bemisia tabaci y Trialeurodes vaporariorum. Máximo 10 l/ha. BBCH 10-89.
	ÁCAROS					Incluye ajo, cebolla, chalote y cebolleta. Incluye Tetranychus urticae, Aceria tulipae. Máximo 10 l/ha. BBCH 10-89.
	TRIPS					Incluye ajo, cebolla, chalote y cebolleta. Incluye Frankliniella occidentalis. Máximo 10 l/ha. BBCH 10-89.
Cucurbitáceas de piel comestible	MOSCA BLANCA	1 - 1,6	1-5	7 días	400-800 l/ha	Incluye pepino, pepinillo, calabacín y chayote. Incluye Bemisia tabaci y Trialeurodes vaporariorum. BBCH 10-89.



USO	AGENTE	Dosis I/HA	Nº Aplic.	Intervalos	Vol. Caldo	FORMA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN (Condic. Específico)
	ACAROS					Incluye pepino, pepinillo, calabacín y chayote. Incluye Tetranychus urticae. BBCH 10-89.
	PULGONES					Incluye pepino, pepinillo, calabacín y chayote. Incluye Myzus persicae, Macrosiphum sp., Macrosiphum euphorbiae, Aphis fabae y Aphis gossypii. BBCH 10-89.
	TRIPS					Incluye pepino, pepinillo, calabacín y chayote. Incluye Thripidae, Frankliniella occidentalis, Thrips tabaci, Thrips sp. BBCH 10-89.
Cucurbitáceas de piel no comestible	PULGONES	1	1-5	7 días	300 - 1000 l/ha	Incluye melón, calabaza y sandía. Incluye Aphis gossypii, Aphis fabae, Macrosiphum euphorbiae, Myzus persicae, Macrosiphum sp. Máximo 10 l/ha. BBCH 10-89.
	MOSCA BLANCA					Incluye melón, calabaza y sandía. Incluye Bemisia tabaci y Trialeurodes vaporariorum. Máximo 10 l/ha. BBCH 10-89.
	ÁCAROS					Incluye melón, calabaza y sandía. Incluye Tetranychus urticae. Máximo 10 l/ha. BBCH 10-89.
	TRIPS					Incluye melón, calabaza y sandía. Incluye Frankliniella occidentalis. Máximo 10 l/ha. BBCH 10-89.





USO	AGENTE	Dosis I/HA	Nº Aplic.	Intervalos	Vol. Caldo	FORMA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN (Condic. Específico)
Endibia	PULGONES	1 - 1,6	1-5	7 días	300-1600 l/ha	Uso menor conforme al artículo 51 del Reglamento (CE) 1107/2009. Ver condicionamiento general (*). Incluye Aphis gossypii, Aphis fabae, Macrosiphum euphorbiae y Myzus persicae. BBCH 10-49.
Espárrago	ÁFIDOS	1	1-5	7 días	300 - 1000 l/ha	Uso menor por jerarquía. Incluye Brachycorynella asparagi. Máximo 10 l/ha. BBCH 10-89.
Especias e infusiones	PULGONES	1	1-5	7 días	300 - 1000 l/ha	Incluye anís, matalauva, comino, alcaravea, regaliz, azafrán, manzanillas, alhova, fonogreco, hierbaluisa, valeriana, ginseng, pimentero, cardamomo, enebros, vainilla, tamarindo, canelero, agarradera, jengibre y nuez moscada. Incluye Aphis gossypii, Aphis fabae, Macrosiphum euphorbiae, Myzus persicae, Macrosiphum sp., Aulacorthum solani, Uroleucon sonchi, Megoura viciae, Aphis craccivora, Acyrthosiphon pisum, Acyrthosiphon sp. Máximo 10 l/ha. BBCH 10-89.
	MOSCA BLANCA					Incluye anís, matalauva, comino, alcaravea, regaliz, azafrán, manzanillas, alhova, fonogreco, hierbaluisa, valeriana, ginseng, pimentero, cardamomo, enebros, vainilla, tamarindo, canelero, agarradera, jengibre y nuez moscada. Incluye Bemisia tabaci y Trialeurodes vaporariorum. Máximo 10 l/ha. BBCH 10-89.



USO	AGENTE	Dosis I/HA	Nº Aplic.	Intervalos	Vol. Caldo	FORMA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN (Condic. Específico)
	ÁCAROS					Incluye anís, matalauva, comino, alcaravea, regaliz, azafrán, manzanillas, alhova, fonogreco, hierbaluisa, valeriana, ginseng, pimentero, cardamomo, enebro, vanilla, tamarindo, canelero, agarradera, jengibre y nuez moscada. Incluye Tetranychus urticae. Máximo 10 l/ha. BBCH 10-89.
	TRIPS					Incluye anís, matalauva, comino, alcaravea, regaliz, azafrán, manzanillas, alhova, fonogreco, hierbaluisa, valeriana, ginseng, pimentero, cardamomo, enebro, vanilla, tamarindo, canelero, agarradera, jengibre y nuez moscada. Incluye Frankliniella occidentalis. Máximo 10 l/ha. BBCH 10-89.
Espinacas y similares	PULGONES	1	1-5	7 días	300 - 1000 l/ha	Incluye acelga, espinaca y verdolaga. Incluye Aphis gossypii, Aphis fabae, Macrosiphum euphorbiae, Myzus persicae, Macrosiphum sp., Nasonovia ribis-nigri, Acyrthosiphon sp., Aulacorthum sp., Uroleucon sonchi, Aphis sp. Máximo 10 l/ha. BBCH 10-17.
	MOSCA BLANCA					Incluye acelga, espinaca y verdolaga. Incluye Bemisia tabaci y Trialeurodes vaporariorum. Máximo 10 l/ha. BBCH 10-17.
	ÁCAROS					Incluye acelga, espinaca y verdolaga. Incluye Tetranychus urticae. Máximo 10 l/ha. BBCH 10-17.



USO	AGENTE	Dosis l/ha	Nº Aplic.	Intervalos	Vol. Caldo	FORMA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN (Condic. Específico)
	TRIPS					Incluye acelga, espinaca y verdolaga. Incluye Frankliniella occidentalis. Máximo 10 l/ha. BBCH 10-17.
	PSILA					Incluye acelga, espinaca y verdolaga. Incluye Psylla alni. Máximo 10 l/ha. BBCH 10-17.
Forestales y ornamentales leñosas	PULGONES	1	1-5	7 días	300 - 1000 l/ha	Incluye coníferas, frondosas, monocotiledóneas leñosas y arbustos y pequeños árboles ornamentales. Incluye también para uso en viveros. Incluye Aphis gossypii, Myzus persicae, Aphis fabae, Macrosiphum euphorbiae, Macrosiphum sp., Aulacorthum circumflexum, Myzus ornatus, Macrosiphoniella sanborni. Máximo 10 l/ha. BBCH 10-89 y BBCH 10-49 en viveros.
	MOSCA BLANCA					Incluye coníferas, frondosas, monocotiledóneas leñosas y arbustos y pequeños árboles ornamentales. Incluye también para uso en viveros. Incluye Bemisia tabaci y Trialeurodes vaporariorum. Máximo 10 l/ha. BBCH 10-89 y BBCH 10-49 en viveros.



USO	AGENTE	Dosis l/ha	Nº Aplic.	Intervalos	Vol. Caldo	FORMA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN (Condic. Específico)
	ÁCAROS					Incluye coníferas, frondosas, monocotiledóneas leñosas y arbustos y pequeños árboles ornamentales. Incluye también para uso en viveros. Incluye Tetranychus urticae. Máximo 10 l/ha. BBCH 10-89 y BBCH 10-49 en viveros.
	TRIPS					Incluye coníferas, frondosas, monocotiledóneas leñosas y arbustos y pequeños árboles ornamentales. Incluye también para uso en viveros. Incluye Frankliniella occidentalis. Máximo 10 l/ha. BBCH 10-89 y BBCH 10-49 en viveros.
Fresal	MOSCA BLANCA	1 - 1,6	1-5	7 días	400-800 l/ha	También en uso protegido. Incluye Bemisia tabaci y Trialeurodes vaporariorum. BBCH 10-89.
	ACAROS					También en uso protegido. Incluye Tetranychus urticae. BBCH 10-89.
	PULGONES					También en uso protegido. Incluye Myzus persicae, Macrosiphum euphorbiae y Aphis gossypii. BBCH 10-89.
	DROSOPHILA					También en uso protegido. Incluye Drosophila Suzuki. BBCH 10-89.
	TRIPS					También en uso protegido. Incluye Thripidae, Frankliniella occidentalis, Thrips tabaci, Thrips sp. BBCH 10-89.



USO	AGENTE	Dosis l/ha	Nº Aplic.	Intervalos	Vol. Caldo	FORMA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN (Condic. Específico)
Herbáceas extensivas	PULGONES	1	1-5	7 días	300 - 1000 l/ha	Exclusivamente para producción de simiente para la siembra. Incluye <i>Aphis gossypii</i> , <i>Myzus persicae</i> , <i>Aphis fabae</i> , <i>Macrosiphum euphorbiae</i> , <i>Macrosiphum sp.</i> , <i>Myzus ornatus</i> , <i>Macrosiphoniella sanborni</i> . Máximo 10 l/ha. BBCH 10-49.
	MOSCA BLANCA					Exclusivamente para producción de simiente para la siembra. Incluye <i>Bemisia tabaci</i> , <i>Trialeurodes vaporariorum</i> . Máximo 10 l/ha. BBCH 10-49.
	ACAROS					Exclusivamente para producción de simiente para la siembra. Incluye <i>Tetranychus urticae</i> . Máximo 10 l/ha. BBCH 10-49.
	TRIPS					Exclusivamente para producción de simiente para la siembra. Incluye <i>Frankliniella occidentalis</i> , <i>Thrips sp.</i> Máximo 10 l/ha. BBCH 10-49.



USO	AGENTE	Dosis I/HA	Nº Aplic.	Intervalos	Vol. Caldo	FORMA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN (Condic. Específico)
Hierbas aromáticas y flores comestibles	PULGONES	1	1-5	7 días	300 - 1000 l/ha	<p>Uso menor conforme al artículo 51 del Reglamento (CE) 1107/2009. Ver condicionamiento general (*).            Incluye perifollo, cebollino, perejil, mentas incluida hierbabuena, cilantro, salvia, romero, tomillo, estragón, acedera, ajedrea, angélica, eneldo, hisopo, mejorana, melisa, orégano, albahaca, ruda, levístico, hierba limón, curcuma longa, clavo de especia, alcaparro.            Incluye Aphis gossypii, Aphis fabae, Macrosiphum euphorbiae, Myzus persicae, Macrosporium sp., Aulacorthum solani, Uroleucon sonchi, Megoura viciae, Aphis Craccivora, Acyrthosiphon pisium, Acyrthosiphon sp.            BBCH 10-89.</p>
	MOSCA BLANCA					<p>Uso menor conforme al artículo 51 del Reglamento (CE) 1107/2009. Ver condicionamiento general (*).            Incluye perifollo, cebollino, perejil, mentas incluida hierbabuena, cilantro, salvia, romero, tomillo, estragón, acedera, ajedrea, angélica, eneldo, hisopo, mejorana, melisa, orégano, albahaca, ruda, levístico, hierba limón, curcuma longa, clavo de especia, alcaparro.            Incluye Trialeurodes vaporariorum, Bemisia tabaci.            BBCH 10-89.</p>



USO	AGENTE	Dosis I/II	Nº Aplic.	Intervalos	Vol. Caldo	FORMA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN (Condic. Específico)
	ÁCAROS					Uso menor conforme al artículo 51 del Reglamento (CE) 1107/2009. Ver condicionamiento general (*). Incluye perifollo, cebollino, perejil, mentas incluida hierbabuena, cilantro, salvia, romero, tomillo, estragón, acedera, ajedrea, angélica, eneldo, hisopo, mejorana, melisa, orégano, albahaca, ruda, levístico, hierba limón, curcuma longa, clavo de especia, alcaparro. Incluye Tetranychus urticae. BBCH 10-89.
	TRIPS					Uso menor conforme al artículo 51 del Reglamento (CE) 1107/2009. Ver condicionamiento general (*). Incluye perifollo, cebollino, perejil, mentas incluida hierbabuena, cilantro, salvia, romero, tomillo, estragón, acedera, ajedrea, angélica, eneldo, hisopo, mejorana, melisa, orégano, albahaca, ruda, levístico, hierba limón, curcuma longa, clavo de especia, alcaparro. Incluye Franklioniella occidentalis. BBCH 10-89.



USO	AGENTE	Dosis l/ha	Nº Aplic.	Intervalos	Vol. Caldo	FORMA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN (Condic. Específico)
Hortalizas del género Brassica	PULGONES	1	1-5	7 días	300 - 1000 l/ha	Incluye inflorescencias, brécol, coliflor, cogollos, col de Bruselas, repollo (hojas), col de China, berza, col y colirrábano. Incluye Aphis gossypii, Aphis fabae, Macrosiphum euphorbiae, Myzus persicae, Macrosiphum sp., Brevicoryne brassicae, Lipaphis erysimae. Máximo 10 l/ha. BBCH 10-49.
	MOSCA BLANCA					Incluye inflorescencias, brécol, coliflor, cogollos, col de Bruselas, repollo (hojas), col de China, berza, col y colirrábano. Incluye Bemisia tabaci y Trialeurodes vaporariorum. Máximo 10 l/ha. BBCH 10-49.
	ÁCAROS					Incluye inflorescencias, brécol, coliflor, cogollos, col de Bruselas, repollo (hojas), col de China, berza, col y colirrábano. Incluye Tetranychus urticae. Máximo 10 l/ha. BBCH 10-49.
	TRIPS					Incluye inflorescencias, brécol, coliflor, cogollos, col de Bruselas, repollo (hojas), col de China, berza, col y colirrábano. Incluye Frankliniella occidentalis. Máximo 10 l/ha. BBCH 10-49.
	PSILA					Incluye Psylla sp. Máximo 10 l/ha. BBCH 10-49.





USO	AGENTE	Dosis l/ha	Nº Aplic.	Intervalos	Vol. Caldo	FORMA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN (Condic. Específico)
Hortícolas	PULGONES	1	1-5	7 días	300 - 1000 l/ha	Exclusivamente para semilleros de hortícolas. Incluye Aphis gossypii, Myzus persicae, Aphis fabae, Macrosiphum euphorbiae, Macrosiphum sp., Myzus ornatus, Macrosiphoniella sanborni. Máximo 10 l/ha. BBCH 10-49.
	MOSCA BLANCA					Exclusivamente para semilleros de hortícolas. Incluye Bemisia tabaci, Trialeurodes vaporariorum. Máximo 10 l/ha. BBCH 10-49.
	ACAROS					Exclusivamente para semilleros de hortícolas. Incluye Tetranychus urticae. Máximo 10 l/ha. BBCH 10-49.
	TRIPS					Exclusivamente para semilleros de hortícolas. Incluye Frankliniella occidentalis, Thrips sp. Máximo 10 l/ha. BBCH 10-49.
Lechuga y similares	PULGONES	1	1-5	7 días	300 - 1000 l/ha	Incluye berro, mastuerzo, canónigos, lechuga, escarola, achicoria (hojas), rúcula, mostaza china, diente de león, barbarea y brotes tiernos, incluidas las especies de Brassica. Incluye Aphis gossypii, Aphis fabae, Macrosiphum euphorbiae, Myzus persicae, Macrosiphum sp., Nasonovia ribis-nigri, Acyrthosiphon sp., Aulacorthum sp., Uroleucon sonchi, Aphis sp. Máximo 10 l/ha. BBCH 10-17.



USO	AGENTE	Dosis I/HA	Nº Aplic.	Intervalos	Vol. Caldo	FORMA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN (Condic. Específico)
	MOSCA BLANCA					Incluye berro, mastuerzo, canónigos, lechuga, escarola, achicoria (hojas), rúcula, mostaza china, diente de león, barbarea y brotes tiernos, incluidas las especies de Brassica. Incluye Bemisia tabaci y Trialeurodes vaporariorum. Máximo 10 l/ha. BBCH 10-17.
	ÁCAROS					Incluye berro, mastuerzo, canónigos, lechuga, escarola, achicoria (hojas), rúcula, mostaza china, diente de león, barbarea y brotes tiernos, incluidas las especies de Brassica. Incluye Tetranychus urticae. Máximo 10 l/ha. BBCH 10-17.
	TRIPS					Incluye berro, mastuerzo, canónigos, lechuga, escarola, achicoria (hojas), rúcula, mostaza china, diente de león, barbarea y brotes tiernos, incluidas las especies de Brassica. Incluye Frankliniella occidentalis. Máximo 10 l/ha. BBCH 10-17.
Leguminosas de grano	PULGONES	1	1-5	7 días	300 - 1000 l/ha	Incluye altramuz, garbanzo, habas para grano, judías para grano, lentejas, guisantes para grano y almorta. Incluye Aphis gossypii, Aphis fabae, Macrosiphum euphorbiae, Myzus persicae, Macrosiphum sp., Aulacorthum solani, Uroleucon sonchi, Megoura viciae, Aphis craccivora, Acyrthosiphon pisum, Acyrthosiphon sp. Máximo 10 l/ha. BBCH 10-89.



USO	AGENTE	Dosis I/HA	Nº Aplic.	Intervalos	Vol. Caldo	FORMA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN (Condic. Específico)
	MOSCA BLANCA					Incluye altramuz, garbanzo, habas para grano, judías para grano, lentejas, guisantes para grano y almorta. Incluye Bemisia tabaci y Trialeurodes vaporariorum. Máximo 10 l/ha. BBCH 10-89.
	ÁCAROS					Incluye altramuz, garbanzo, habas para grano, judías para grano, lentejas, guisantes para grano y almorta. Incluye Tetranychus urticae. Máximo 10 l/ha. BBCH 10-89.
	TRIPS					Incluye altramuz, garbanzo, habas para grano, judías para grano, lentejas, guisantes para grano y almorta. Incluye Frankliniella occidentalis. Máximo 10 l/ha. BBCH 10-89.
Leguminosas verdes (frescas)	PULGONES	1	1-5	7 días	300 - 1000 l/ha	Incluye judías verdes, guisantes verdes y habas verdes. Incluye Aphis gossypii, Aphis fabae, Macrosiphum euphorbiae, Myzus persicae, Macrosiphum sp, Aulacorthum solani, Uroleucon sonchi, Megoura viciae, Aphis craccivora, Acyrthosiphon pisum, Acyrthosiphon sp. Máximo 10 l/ha. BBCH 10-89.
	MOSCA BLANCA					Incluye judías verdes, guisantes verdes y habas verdes. Incluye Bemisia tabaci y Trialeurodes vaporariorum. Máximo 10 l/ha. BBCH 10-89.



USO	AGENTE	Dosis l/ha	Nº Aplic.	Intervalos	Vol. Caldo	FORMA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN (Condic. Específico)
	ÁCAROS					Incluye judías verdes, guisantes verdes y habas verdes. Incluye Tetranychus urticae. Máximo 10 l/ha. BBCH 10-89.
	TRIPS					Incluye judías verdes, guisantes verdes y habas verdes. Incluye Frankliniella occidentalis. Máximo 10 l/ha. BBCH 10-89.
Okra, quimbombo	PULGONES	1	1-5	7 días	300 - 1000 l/ha	Uso menor por jerarquía. Incluye Aphis gossypii, Aphis fabae, Macrosiphum euphorbiae, Myzus persicae, Macrosiphum sp. Máximo 10 l/ha. BBCH 10-89.
	MOSCA BLANCA					Uso menor por jerarquía. Incluye Bemisia tabaci y Trialeurodes vaporariorum. Máximo 10 l/ha. BBCH 10-89.
	ÁCAROS					Uso menor por jerarquía. Incluye Tetranychus urticae. Máximo 10 l/ha. BBCH 10-89.
	TRIPS					Uso menor por jerarquía. Incluye Thripidae, Frankliniella occidentalis, Thrips tabaci, Thrips sp. Máximo 10 l/ha. BBCH 10-89.



USO	AGENTE	Dosis l/ha	Nº Aplic.	Intervalos	Vol. Caldo	FORMA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN (Condic. Específico)
Ornamentales herbáceas	PULGONES	1	1-5	7 días	300 - 1000 l/ha	Incluye begonia, ciclamen, dalia, gladiolo, jacinto, ismene, tulipán, narciso, azucena, violeta, geranio, malva, gerbera, anturio, clavel, crisantemo, petunia, agerato, cineraria, impatiens, Kalanchoe, lirio de los valles y lobelia, tagetes, caléndulas, capuchina. Incluye Aphis gossypii, Aphis fabae, Macrosiphum euphorbiae, Myzus persicae, Macrosiphum sp., Aulacorthum circumflexum, Myzus ornatus, Macrosiphoniella sanborni. Máximo 10 l/ha. BBCH 10-89.
	MOSCA BLANCA					Incluye begonia, ciclamen, dalia, gladiolo, jacinto, ismene, tulipán, narciso, azucena, violeta, geranio, malva, gerbera, anturio, clavel, crisantemo, petunia, agerato, cineraria, impatiens, Kalanchoe, lirio de los valles y lobelia, tagetes, caléndulas, capuchina. Incluye Bemisia tabaci y Trialeurodes vaporariorum. Máximo 10 l/ha. BBCH 10-89.



USO	AGENTE	Dosis l/ha	Nº Aplic.	Intervalos	Vol. Caldo	FORMA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN (Condic. Específico)
	ÁCAROS					Incluye begonia, ciclamen, dalia, gladiolo, jacinto, ismene, tulipán, narciso, azucena, violeta, geranio, malva, gerbera, anturio, clavel, crisantemo, petunia, agerato, cineraria, impatiens, Kalanchoe, lirio de los valles y lobelia, tagetes, caléndulas, capuchina. Incluye Tetranychus urticae. Máximo 10 l/ha. BBCH 10-89.
	TRIPS					Incluye begonia, ciclamen, dalia, gladiolo, jacinto, ismene, tulipán, narciso, azucena, violeta, geranio, malva, gerbera, anturio, clavel, crisantemo, petunia, agerato, cineraria, impatiens, Kalanchoe, lirio de los valles y lobelia, tagetes, caléndulas, capuchina. Incluye Franklioniella occidentalis. Máximo 10 l/ha. BBCH 10-89.
Perejil	PULGONES	1 - 1,6	1	-	300-1600 l/ha	Uso menor conforme al artículo 51 del Reglamento (CE) 1107/2009. Ver condicionamiento general (*). Incluye Aphis gossypii, Aphis fabae, Macrosiphum euphorbiae, Myzus persicae. BBCH 10-49.
	MOSCA BLANCA					Uso menor conforme al artículo 51 del Reglamento (CE) 1107/2009. Ver condicionamiento general (*). Incluye Trialeurodes vaporariorum, Bemisia tabaci. BBCH 10-49.



USO	AGENTE	Dosis I/HA	Nº Aplic.	Intervalos	Vol. Caldo	FORMA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN (Condic. Específico)
	ACAROS					Uso menor conforme al artículo 51 del Reglamento (CE) 1107/2009. Ver condicionamiento general (*). Incluye Tetranychus urticae. BBCH 10-49.
	TRIPS					Uso menor conforme al artículo 51 del Reglamento (CE) 1107/2009. Ver condicionamiento general (*). BBCH 10-49.
Pimiento	PULGONES	1	1-5	7 días	300 - 1000 l/ha	Incluye Aphis gossypii, Aphis fabae, Macrosiphum euphorbiae, Myzus persicae, Macrosiphum sp. Máximo 10 l/ha. BBCH 10-89.
	MOSCA BLANCA					Incluye Bemisia tabaci y Trialeurodes vaporariorum. Máximo 10 l/ha. BBCH 10-89.
	ÁCAROS					Incluye Tetranychus urticae. Máximo 10 l/ha. BBCH 10-89.
	TRIPS					Incluye Frankliniella occidentalis. Máximo 10 l/ha. BBCH 10-89.
Platanera	PULGONES	1	1-5	7 días	300 - 1000 l/ha	Uso menor por jerarquía. Incluye Aphis gossypii, Aphis fabae, Macrosiphum euphorbiae, Myzus persicae. Máximo 10 l/ha. BBCH 10-89.
	MOSCA BLANCA					Uso menor por jerarquía. Incluye Aleurothrixus sp. Máximo 10 l/ha. BBCH 10-89.
	ÁCAROS					Uso menor por jerarquía. Incluye Tetranychus urticae. Máximo 10 l/ha. BBCH 10-89.



USO	AGENTE	Dosis l/ha	Nº Aplic.	Intervalos	Vol. Caldo	FORMA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN (Condic. Específico)
	TRIPS					<p>Uso menor por jerarquía.            Incluye Thrips sp, Hercinothrips femoralis, Thrips florum.            Máximo 10 l/ha.            BBCH 10-89.</p>
	COCHINILLAS					<p>Uso menor por jerarquía.            Incluye Planococcus citri, Dysmicoccus grasii.            Máximo 10 l/ha.            BBCH 10-89.</p>
Rábano	PSILA	1	1-5	7 días	300 - 1000 l/ha	<p>Uso menor por jerarquía.            Incluye rábano y rabanillo.            Incluye Psylla sp.            Máximo 10 l/ha.            BBCH 10-89.            BBCH 10-89.</p>
Raíces y tubérculos (excepto remolacha azucarera y patata)	PULGONES	1	1-5	7 días	300 - 1000 l/ha	<p>Excepto boniato.            Incluye remolacha forrajera, remolacha de mesa, zanahoria, apionabo, nabo, rábano, rábano rusticano, chirivía, rabanillo, salsifí, colinabo, escorzonera, pataca, aguaturma, tupinambo, raíz de perejil, batata, ñame y chufa.            Incluye Aphis gossypii, Aphis fabae, Macrosiphum euphorbiae, Myzus persicae, Macrosiphum sp., Aulacorthum solani, Uroleucon sonchi, Megoura viciae, Aphis craccivora, Acyrthosiphon pisum, Acyrthosiphon sp.            Máximo 10 l/ha.            BBCH 10-89.</p>





USO	AGENTE	Dosis l/ha	Nº Aplic.	Intervalos	Vol. Caldo	FORMA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN (Condic. Específico)
	MOSCA BLANCA					Excepto boniato. Incluye remolacha forrajera, remolacha de mesa, zanahoria, nabo, apionabo, rábano, rábano rusticano, chirivía, rabanillo, salsifí, colinabo, escorzonera, patata, aguaturma, tupinambo, raíz de perejil, batata, ñame y chufa. Incluye Bemisia tabaci y Trialeurodes vaporariorum. Máximo 10 l/ha. BBCH 10-89.
	ÁCAROS					Excepto boniato. Incluye remolacha forrajera, remolacha de mesa, zanahoria, nabo, apionabo, rábano, rábano rusticano, chirivía, rabanillo, salsifí, colinabo, escorzonera, patata, aguaturma, tupinambo, raíz de perejil, batata, ñame y chufa. Incluye Tetranychus urticae. Máximo 10 l/ha. BBCH 10-89.
	TRIPS					Excepto boniato. Incluye remolacha forrajera, remolacha de mesa, zanahoria, nabo, apionabo, rábano, rábano rusticano, chirivía, rabanillo, salsifí, colinabo, escorzonera, patata, aguaturma, tupinambo, raíz de perejil, batata, ñame y chufa. Incluye Frankliniella occidentalis. Máximo 10 l/ha. BBCH 10-89.



USO	AGENTE	Dosis l/ha	Nº Aplic.	Intervalos	Vol. Caldo	FORMA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN (Condic. Específico)
Rosales	PULGONES	1	1-5	7 días	300 - 1000 l/ha	Incluye Aphis gossypii, Myzus persicae, Aphis fabae, Macrosiphum euphorbiae, Macrosiphum sp., Myzus ornatus, Macrosiphoniella sanborni. Máximo 10 l/ha. BBCH 10-89.
	MOSCA BLANCA					Incluye Bemisia tabaci, Trialeurodes vaporariorum y Aleurocanthus spiniferus. Máximo 10 l/ha. BBCH 10-89.
	ÁCAROS					Incluye Tetranychus urticae. Máximo 10 l/ha. BBCH 10-89.
	TRIPS					Incluye Frankliniella occidentalis. Máximo 10 l/ha. BBCH 10-89.
Rúcula	PSILA	1	1-5	7 días	300 - 1000 l/ha	Uso menor por jerarquía. Incluye Psylla sp. Máximo 10 l/ha. BBCH 10-89.
Tallos jóvenes	PULGONES	1	1-5	7 días	300 - 1000 l/ha	Incluye espárrago, cardo, hinojo, alcachofa, puerro, ajete, ajo tierno, ruibarbo y borraja. Incluye Aphis gossypii, Aphis fabae, Macrosiphum euphorbiae, Myzus persicae, Macrosiphum sp., Aulacorthum solani, Uroleucon sonchi, Megoura viciae, Aphis craccivora, Acyrtosiphon pisum, Acyrtosiphon sp. Máximo 10 l/ha. BBCH 10-89.
	MOSCA BLANCA					Incluye espárrago, cardo, hinojo, alcachofa, puerro, ajete, ajo tierno, ruibarbo y borraja. Incluye Bemisia tabaci y Trialeurodes vaporariorum. Máximo 10 l/ha. BBCH 10-89.



USO	AGENTE	Dosis l/ha	Nº Aplic.	Intervalos	Vol. Caldo	FORMA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN (Condic. Específico)
	ÁCAROS					Incluye espárrago, cardo, hinojo, alcachofa, puerro, ajete, ajo tierno, ruibarbo y borraja. Incluye Tetranychus urticae. Máximo 10 l/ha. BBCH 10-89.
	TRIPS					Incluye Frankliniella occidentalis. Máximo 10 l/ha. BBCH 10-89.
Tomate	TRIPS	1 - 1,6	1-5	7 días	400-800 l/ha	Incluye Thripidae, Frankliniella occidentalis, Thrips tabaci, Thrips sp. BBCH 10-89.
	MOSCA BLANCA					Incluye Bemisia tabaci y Trialeurodes vaporariorum. BBCH 10-89.
	ACAROS					Incluye Aculops lycopersici y Tetranychus urticae. BBCH 10-89.
	PULGONES					Incluye Myzus persicae, Macrosiphum euphorbiae, Aphis fabae y Aphis gossypii. BBCH 10-89.
	TUTA ABSOLUTA				300-1600 l/ha	Incluye BBCH 10-89.

**Plazos de Seguridad (Protección del consumidor):**



Uso	P.S. (días)
Adormidera, Aguacate, Alfalfa, Algodonero, Apio, Árboles y arbustos frutales, Arbustos frutales, Arroz, Batata, boniato, Berenjena, Brotes tiernos, incluidas las especies de Brassica, Bulbos hortícolas, Caqui, Cebolla, Cebolleta, Cereales de invierno / primavera, Cerezo, Cítricos, Colza, Cucurbitáceas de piel comestible, Cucurbitáceas de piel no comestible, Endibia, Espárrago, Especies e infusiones, Espinacas y similares, Forestales y ornamentales leñosas, Fresal, Frutales de cáscara, Frutales de hueso, Frutales de pepita, Girasol, Granada, Guayabo, Herbáceas extensivas, Hierbas aromáticas y flores comestibles, Higuera, Hortalizas del género Brassica, Hortícolas, Kiwi, Kumquat, Lechuga y similares, Leguminosas de grano, Leguminosas verdes (frescas), Lúpulo, Maíz, Maíz dulce, Mango, Okra, quimbombo, Olivo, Ornamentales herbáceas, Papaya, Pastos y praderas, Patata, Perejil, Pimiento, Pinos, Piña Tropical, Platanera, Puerro, Rábano, Raíces de achicoria (industrial), Raíces y tubérculos (excepto remolacha azucarera y patata), Remolacha azucarera, Rosales, Rúcula, Soja, Sorgo, Tabaco, Tallos jóvenes, Tomate, Vid	NO PROCEDE

**Fecha de Liberación (Protección de Datos):**



Uso - Agente	Fecha de Liberación
<p>Adormidera, Aguacate, Alfalfa, Algodonero, Apio, Árboles y arbustos frutales, Árboles y arbustos frutales, Arbustos frutales, Arroz, Batata, boniato, Brotes tiernos, incluidas las especies de Brassica, Bulbos hortícolas, Bulbos hortícolas, Caqui, Cereales de invierno / primavera, Cítricos, Colza, Cucurbitáceas de piel comestible, Cucurbitáceas de piel no comestible, Cucurbitáceas de piel no comestible, Endibia, Especies e infusiones, Especies e infusiones, Espinacas y similares, Espinacas y similares, Forestales y ornamentales leñosas, Forestales y ornamentales leñosas, Fresal, Frutales de cáscara, Frutales de hueso, Frutales de pepita, Girasol, Granado, Guayabo, Herbáceas extensivas, Herbáceas extensivas, Hierbas aromáticas y flores comestibles, Hierbas aromáticas y flores comestibles, Hortalizas del género Brassica, Hortalizas del género Brassica, Hortícolas, Hortícolas, Kumquat, Lechuga y similares, Lechuga y similares, Leguminosas de grano, Leguminosas de grano, Leguminosas verdes (frescas), Leguminosas verdes (frescas), Lúpulo, Maíz, Maíz dulce, Mango, Okra, quimbombo, Okra, quimbombo, Olivo, Ornamentales herbáceas, Ornamentales herbáceas, Papaya, Pastos y praderas, Patata, Perejil, Pimiento, Pimiento, Pinos, Piña Tropical, Platanera, Platanera, Raíces de achicoria (industrial), Raíces y tubérculos (excepto remolacha azucarera y patata), Raíces y tubérculos (excepto remolacha azucarera y patata), Remolacha azucarera, Rosales, Rosales, Soja, Sorgo, Tabaco, Tallos jóvenes, Tallos jóvenes, Tomate, Tomate, Vid, - PULGONES</p>	<p>20/09/2027</p>



Uso - Agente	Fecha de Liberación
<p>Adormidera, Aguacate, Alfalfa, Algodonero, Apio, Árboles y arbustos frutales, Árboles y arbustos frutales, Arroz, Berenjena, Berenjena, Brotes tiernos, incluidas las especies de Brassica, Bulbos hortícolas, Bulbos hortícolas, Caqui, Cereales de invierno / primavera, Cítricos, Colza, Cucurbitáceas de piel comestible, Cucurbitáceas de piel no comestible, Cucurbitáceas de piel no comestible, Especies e infusiones, Especies e infusiones, Espinacas y similares, Espinacas y similares, Forestales y ornamentales leñosas, Forestales y ornamentales leñosas, Fresal, Frutales de cáscara, Frutales de hueso, Frutales de pepita, Girasol, Granado, Guayabo, Herbáceas extensivas, Herbáceas extensivas, Hierbas aromáticas y flores comestibles, Hierbas aromáticas y flores comestibles, Hortalizas del género Brassica, Hortalizas del género Brassica, Hortícolas, Hortícolas, Kumquat, Lechuga y similares, Lechuga y similares, Leguminosas de grano, Leguminosas de grano, Leguminosas verdes (frescas), Leguminosas verdes (frescas), Lúpulo, Maíz, Maíz dulce, Mango, Okra, quimbombo, Okra, quimbombo, Olivo, Ornamentales herbáceas, Ornamentales herbáceas, Papaya, Pastos y praderas, Patata, Perejil, Pimiento, Pimiento, Pinos, Piña Tropical, Platanera, Platanera, Raíces de achicoria (industrial), Raíces y tubérculos (excepto remolacha azucarera y patata), Raíces y tubérculos (excepto remolacha azucarera y patata), Remolacha azucarera, Rosales, Rosales, Soja, Sorgo, Tabaco, Tallos jóvenes, Tallos jóvenes, Tomate, Tomate, Vid, - MOSCA BLANCA</p>	<p>20/09/2027</p>



Uso - Agente	Fecha de Liberación
<p>Adormidera, Aguacate, Alfalfa, Algodonero, Arroz, Batata, boniato, Bulbos hortícolas, Bulbos hortícolas, Caqui, Cereales de invierno / primavera, Cítricos, Colza, Cucurbitáceas de piel no comestible, Cucurbitáceas de piel no comestible, Especies e infusiones, Especies e infusiones, Espinacas y similares, Espinacas y similares, Forestales y ornamentales leñosas, Forestales y ornamentales leñosas, Frutales de cáscara, Frutales de hueso, Frutales de pepita, Girasol, Granado, Guayabo, Hierbas aromáticas y flores comestibles, Hierbas aromáticas y flores comestibles, Higuera, Hortalizas del género Brassica, Hortalizas del género Brassica, Kiwi, Kumquat, Lechuga y similares, Lechuga y similares, Leguminosas de grano, Leguminosas de grano, Leguminosas verdes (frescas), Leguminosas verdes (frescas), Lúpulo, Maíz, Maíz dulce, Mango, Okra, quimbombo, Okra, quimbombo, Ornamentales herbáceas, Ornamentales herbáceas, Papaya, Pastos y praderas, Patata, Pimiento, Pimiento, Pinos, Piña Tropical, Platanera, Platanera, Raíces de achicoria (industrial), Raíces y tubérculos (excepto remolacha azucarera y patata), Raíces y tubérculos (excepto remolacha azucarera y patata), Remolacha azucarera, Rosales, Rosales, Soja, Sorgo, Tabaco, Tallos jóvenes, Tallos jóvenes, Vid, - ÁCAROS</p>	<p>20/09/2027</p>



Uso - Agente	Fecha de Liberación
Adormidera, Aguacate, Alfalfa, Algodonero, Apio, Árboles y arbustos frutales, Árboles y arbustos frutales, Arbustos frutales, Arroz, Batata, boniato, Brotes tiernos, incluidas las especies de Brassica, Bulbos hortícolas, Bulbos hortícolas, Caqui, Cereales de invierno / primavera, Cítricos, Colza, Cucurbitáceas de piel comestible, Cucurbitáceas de piel no comestible, Cucurbitáceas de piel no comestible, Especies e infusiones, Especies e infusiones, Espinacas y similares, Espinacas y similares, Forestales y ornamentales leñosas, Forestales y ornamentales leñosas, Fresal, Frutales de cáscara, Frutales de hueso, Frutales de pepita, Girasol, Granado, Guayabo, Herbáceas extensivas, Herbáceas extensivas, Hierbas aromáticas y flores comestibles, Hierbas aromáticas y flores comestibles, Higuera, Hortalizas del género Brassica, Hortalizas del género Brassica, Hortícolas, Hortícolas, Kumquat, Lechuga y similares, Lechuga y similares, Leguminosas de grano, Leguminosas de grano, Leguminosas verdes (frescas), Leguminosas verdes (frescas), Lúpulo, Maíz, Maíz dulce, Mango, Okra, quimbombo, Okra, quimbombo, Olivo, Ornamentales herbáceas, Ornamentales herbáceas, Papaya, Pastos y praderas, Patata, Perejil, Pimiento, Pimiento, Pinos, Piña Tropical, Platanera, Platanera, Raíces de achicoria (industrial), Raíces y tubérculos (excepto remolacha azucarera y patata), Raíces y tubérculos (excepto remolacha azucarera y patata), Remolacha azucarera, Rosales, Rosales, Soja, Sorgo, Tabaco, Tallos jóvenes, Tallos jóvenes, Tomate, Tomate, Vid, - TRIPS	20/09/2027
Aguacate, Caqui, Cítricos, Frutales de cáscara, Guayabo, Higuera, Kiwi, Kumquat, Mango, Olivo, Papaya, Pinos, Piña Tropical, Platanera, Platanera, Vid, - COCHINILLAS	20/09/2027
Apio, Árboles y arbustos frutales, Árboles y arbustos frutales, Arbustos frutales, Berenjena, Berenjena, Brotes tiernos, incluidas las especies de Brassica, Cucurbitáceas de piel comestible, Fresal, Herbáceas extensivas, Herbáceas extensivas, Hortícolas, Hortícolas, Perejil, Tomate, Tomate, - ACAROS	20/09/2027
Arbustos frutales, Cerezo, Fresal, Vid, - DROSOPHILA	20/09/2027





Uso - Agente	Fecha de Liberación
Berenjena, Berenjena, - FRANKLINIELLA OCCIDENTALIS	20/09/2027
Berenjena, Berenjena, Tomate, Tomate, - TUTA ABSOLUTA	20/09/2027
Cebolla, Cebolleta, - POLILLA	20/09/2027
Cerezo, - PIOJO DE SAN JOSE	20/09/2027
Espárrago, Espárrago, - ÁFIDOS	20/09/2027
Espinacas y similares, Espinacas y similares, Frutales de pepita, Higuera, Hortalizas del género Brassica, Puerro, Rábano, Rábano, Rúcula, Rúcula, - PSILA	20/09/2027
Kiwi, Vid, - CICADELIDOS	20/09/2027
Kiwi, Olivo, - ALGODÓN	20/09/2027

**Condiciones generales de uso:**

Aplicación por pulverización foliar de alto volumen manual o con tractor.

Aplicar a los primeros síntomas de infestación.

El producto debe de entrar en contacto directo con la plaga: es esencial cubrir las superficies de las hojas superiores e inferiores.

En la etiqueta se darán las instrucciones oportunas para el correcto uso del producto.

**Excepciones: --****Clase de usuario:**

Uso profesional.

Uso	Profesional / No Profesional	Agrario / No Agrario
Adormidera, Aguacate, Alfalfa, Algodonero, Apio, Árboles y arbustos frutales, Arbustos frutales, Arroz, Batata, boniato, Berenjena, Brotes tiernos, incluidas las especies de Brassica, Bulbos hortícolas, Caqui, Cebolla, Cebolleta, Cereales de invierno / primavera, Cerezo, Cítricos, Colza, Cucurbitáceas de piel comestible, Cucurbitáceas de piel no comestible, Endibia, Espárrago, Especies e infusiones, Espinacas y similares, Forestales y ornamentales leñosas,	Profesional	Agrario



Fresal, Frutales de cáscara, Frutales de hueso, Frutales de pepita, Girasol, Granado, Guayabo, Herbáceas extensivas, Hierbas aromáticas y flores comestibles, Higuera, Hortalizas del género Brassica, Hortícolas, Kiwi, Kumquat, Lechuga y similares, Leguminosas de grano, Leguminosas verdes (frescas), Lúpulo, Maíz, Maíz dulce, Mango, Okra, quimbombo, Olivo, Ornamentales herbáceas, Papaya, Pastos y praderas, Patata, Perejil, Pimiento, Pinos, Piña Tropical, Platanera, Puerro, Rábano, Raíces de achicoria (industrial), Raíces y tubérculos (excepto remolacha azucarera y patata), Remolacha azucarera, Rosales, Rúcula, Soja, Sorgo, Tabaco, Tallos jóvenes, Tomate, Vid		
---	--	--

**Mitigación de riesgos en la manipulación:****Seguridad del APLICADOR:**

Tanto al aire libre como en invernadero, durante la mezcla/carga se deberán utilizar guantes de protección química, ropa de protección química C1 o tipo 6, delantal PB3 o PB4 o C3 y calzado resistente a productos químicos y durante la aplicación guantes de protección química, ropa de protección química C1 o tipo 6 y calzado resistente a productos químicos.

**Seguridad del TRABAJADOR:**

Tanto al aire libre como en invernadero, durante la reentrada se deberán utilizar ropa de trabajo adecuada o C1.

**Normativa aplicable:**

Nota 1: Guantes de protección contra productos químicos conforme a la norma UNE-EN ISO 374-1:2016/A1:2018. Los guantes pueden ser reutilizables o desechables.

Nota 2: Ropa de protección química tipo 6: frente a salpicaduras de líquidos conforme a norma UNE EN 13034:2005+A1:2009.

Nota 3: Ropa de trabajo adecuada: Mono o chaqueta de manga larga y pantalón largo hechos de algodón (> 300 g/m<sup>2</sup>) o de algodón y poliéster (> 200 g/m<sup>2</sup>).

Nota 4: Calzado resistente a productos químicos, al menos botas tobilleras, de caucho u otro material polimérico (clasificación II) conforme a la norma UNE EN 13832-2:2020.



Nota 5: Ropa de protección C1/C3, frente a productos fitosanitarios según norma UNE EN ISO 27065: 2017/A1:2019.

Nota 6: Ropa de protección parcial tipo PB3 o PB4: Ropa de protección contra productos químicos líquidos. Requisitos de prestaciones para la ropa con uniones herméticas a los líquidos (tipo 3) o con uniones herméticas a las pulverizaciones (tipo 4), incluyendo las prendas que ofrecen protección únicamente a ciertas partes del cuerpo (Tipos PB [3] y PB [4]) según norma UNE-EN 14605:2005+A1:2009.

Medidas adicionales de mitigación para el operador:

- En la limpieza y mantenimiento del equipo se aplicarán las mismas medidas de protección que en aplicación.
- Evitar el contacto con el follaje húmedo durante la aplicación.

- Al aire libre durante la aplicación con tractor se deberán usar los guantes de protección química únicamente para manipular el equipo de aplicación o superficies contaminadas.

Medidas adicionales de mitigación para el trabajador:

- No entrar en los cultivos tratados hasta que se haya secado la pulverización.

### **Clasificaciones y Etiquetado:**

<b>Clase y categoría de peligro (Humana)</b>	Irritación ocular. Categoría 2. Toxicidad específica en determinados órganos (exposición única). Categoría 3.
<b>Pictograma</b>	GHS07 (signo de exclamación)
<b>Palabra Advertencia</b>	Atención
<b>Indicaciones de peligro</b>	H319 - Provoca irritación ocular grave. H335 - Puede irritar las vías respiratorias.
<b>Consejos de Prudencia</b>	P261 - Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla /los vapores/el aerosol. P280 - Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección. P304+P340 - EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración. P305+P351+P338 - EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Enjuagar con agua cuidadosamente durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto cuando estén presentes y pueda hacerse con facilidad. Proseguir con el lavado.
<b>Clase y categoría de peligro (Medio ambiental)</b>	Acuático crónico 3
<b>Pictograma</b>	
<b>Palabra Advertencia</b>	--
<b>Indicaciones de peligro</b>	H412 - Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos duraderos.
<b>Consejos Prudencia</b>	P273 - Evitar su liberación al medio ambiente. P501 - Elimínense el contenido y/o su recipiente de acuerdo con la normativa sobre residuos peligrosos.



**“A FIN DE EVITAR RIESGOS PARA LAS PERSONAS Y EL MEDIO AMBIENTE SIGA LAS INSTRUCCIONES DE USO”, en caracteres que resalten el texto.**

**Mitigación de riesgos ambientales:**

Spe2: No aplicar en suelos drenados con pH > 7,5 y pendiente <0,5% en el caso de cítricos y patatas.

Spe2: No aplicar en suelos drenados en el caso de alfalfa.

Spe2: No aplicar en campos que presenten pendiente >4% en el caso de cereales de primavera y arroz.

Spe3: Para proteger los organismos acuáticos, respétese sin tratar una banda de seguridad de:

- 20 m con 10 m de cubierta vegetal y boquillas de reducción de la deriva del 30% para frutales de pepita y hueso, frutales de cáscara.

- 20 m con cubierta vegetal para cítricos, olivos, tabaco, patata, pimiento, tomate, berenjena, okra, cucurbitáceas de piel no comestible, soja, leguminosas verdes frescas, leguminosas de grano, maíz, remolacha azucarera, boniato, raíces y tubérculos, tallos jóvenes, espárrago, bulbos hortícolas, cebolla, cebolleta, hortalizas del género Brassica, cereales de invierno/primavera, arroz, sorgo, maíz, lechuga y similares, espinacas y similares, vid.

- 10 m con cubierta vegetal para alfalfa.

- 5 m para algodónero, especias e infusiones, ornamentales herbáceas, rosales, forestales y ornamentales leñosas, colza, girasol, lúpulo, adormidera, raíces de achicoria (industrial), pastos y praderas, pinos, platanera, granado, mango, higuera, kiwi, kumquat, piña tropical, aguacate, guayabo, papaya, caqui.

SPe 8: Peligroso para las abejas. Para proteger las abejas y otros insectos polinizadores, no aplicar durante la floración de los cultivos. No utilizar donde haya abejas en pecoreo activo.

Cualquier actividad que se realice con el presente preparado deberá tener en cuenta las condiciones establecidas en los artículos 31, 32 y 33 del Real Decreto 1311/2012, por el que se establece el marco de actuación para conseguir un uso sostenible de los productos fitosanitarios.

**Eliminación Producto y/o caldo:**

SP1: NO CONTAMINAR EL AGUA CON EL PRODUCTO NI CON SU ENVASE. (No limpiar el equipo de aplicación del producto cerca de aguas superficiales/Evítase la contaminación a través de los sistemas de evacuación de aguas de las explotaciones o de los caminos).

**Gestión de envases:**

Enjuague enérgicamente tres veces cada envase que utilice, vertiendo el agua de lavado al depósito (del pulverizador). Conforme a lo establecido en el Real Decreto 1416/2001, de 14 de diciembre, sobre envases de productos fitosanitarios, en la etiqueta deberá figurar la siguiente frase: Entregar los envases vacíos o residuos de envases bien en los puntos de recogida establecidos por los sistemas colectivos de responsabilidad ampliada (SIG) o directamente en el punto de venta donde se hubiera adquirido si dichos envases se han puesto en el mercado a través de un sistema de depósito, devolución y retorno.

**Otras indicaciones reglamentarias:**



Indicaciones que deben figurar en la etiqueta:

EUH401: A fin de evitar riesgos para las personas y el medio ambiente, siga las instrucciones de uso.

Observaciones:

En cumplimiento del artículo 45 del Reglamento (CE) nº 1272/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo de 16 de diciembre de 2008 sobre clasificación, etiquetado y envasado de sustancias y mezclas (CLP), los usuarios intermedios o importadores de mezclas clasificadas para la salud humana o por sus peligros físicos, deberán enviar la información pertinente para la formulación de medidas preventivas y curativas, en particular para la respuesta sanitaria en caso de urgencia al Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses (Organismo designado a tal efecto según la Ley 8/2010 de 31 de marzo).

La Orden JUS/909/2017, de 25 de septiembre, regula el procedimiento de comunicación de dicha información al Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses.

Para incluir el teléfono del Servicio de Información Toxicológica en la etiqueta, instrucciones de primeros auxilios, así como en el apartado 1.4 de la Ficha de Datos de Seguridad es obligatorio haber realizado previamente el alta de la ficha toxicológica según el procedimiento mencionado.

Lo que se informa a los efectos dispuestos en el Real Decreto y los Reglamentos antes citados.

**Condiciones de almacenamiento:**

P403+P233: Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener el recipiente cerrado herméticamente.